

آسپرین (آ.اس.آ)

داروی آ.اس.آ به شکل قرص های 80 میلی گرمی پوشش دار، 100 میلی گرمی جویدنی و 325 میلی گرمی خط دار وجود دارد. قرص های پوشش دار در روده باز می شوند و در بیماری که مشکلات زخم معده دارند، آسیب گوارشی کمتری ایجاد می کند (حروف EC روی جلد قرص به معنی وجود پوشش روده ای است؛ قرص هایی که چنین پوششی دارند نباید جویده شده و یا نصف گردند).



موارد مصرف

- مصرف داروهای مسکن مانند ایبوپروفن ممکن است اثر دارو را در کاهش سکتته های قلبی/مغزی کاهش دهد؛ لذا 8 ساعت قبل و یا 2 تا 4 ساعت بعد از مصرف آسپیرین استفاده گردد.
- برای جلوگیری از آسیب بافت دهان قرص آ.اس.آ را روی لثه یا دندان قرار ندهید.
- قرص های پوشش دار هرگز نباید خرد شده یا جویده شوند.
- در صورت نیاز به هرگونه جراحی در خصوص مصرف آسپیرین یا پزشک/دندان پزشک خود مشورت نمایید؛ ممکن است نیاز باشد که قبل از عمل جراحی مصرف دارو قطع شود.
- هنگامی که آسپیرین به عنوان ضد درد در خانم ها به منظور کاهش انقباضات رحمی در دوره قاعدگی مصرف می شود، بهتر است یک یا دو روز قبل مصرف شوند و در بیماری که خونریزی زیادی دارند توصیه می شود به جای آسپیرین از یک ضد درد دیگر مانند استامینوفن استفاده شود
- تجویز آسپیرین با دوز بالا از هفته 20 بارداری تا زمان زایمان توصیه نمی شود؛ اما در صورتی که پزشک تشخیص می دهد که در دوران بارداری این دارو بایستی مصرف شود، باید در کمترین دوز و در کوتاه ترین زمان ممکن مصرف شود. هم چنین مصرف دارو با دوز بالا در دوران شیردهی توصیه نمی شود و در این خصوص با پزشک مشورت نمایید.
- مصرف دارو احتمال خونریزی را افزایش می دهد؛ لذا بهتر است از مسواک نرم و ریش تراش برقی استفاده گردد.
- در بیماران قلبی مصرف ضد انعقاد مانند وارفارین و هپارین خطر خونریزی را افزایش می دهد.
- در موارد مصرف همزمان آسپیرین و کورتون ها عوارض معده ای افزایش می یابد.

قرص آ.اس.آ به عنوان ضدپلاکت در پیشگیری از سکتته های قلبی و مغزی، تسکین درد و ضد تب استفاده می شود. قرص های آ.اس.آ در معرض حرارت، رطوبت و هوا به سرعت خراب می شوند؛ بنابراین قبل از مصرف آن را بو کنید. در صورت احساس بوی سرکه همه قرص ها را دور بریزید.

نکات مصرف قرص آسپیرین:

- قبل از تجویز دارو در خصوص حساسیت دارویی و بیماری های همراه مانند مشکلات گوارشی، کلیوی، کبدی و غیره به پزشک خود اطلاع دهید.
- کودکان زیر 12 سال که به آبله مرغان، آنفولانزا و یا بیماری نامشخصی مبتلا شده اند و یا اخیراً تزریق واکسن داشته اند، نباید این دارو را مصرف کنند؛ زیرا خطر ابتلا به سندم ری را بالا می برد که یک بیماری نادر ولی جدی است.
- در صورت تحریک معده بهتر است که قرص آسپیرین همراه با یک لیوان پر از آب و غذا مصرف شود.
- حدود نیم ساعت بعد از مصرف دارو از دراز کشیدن خودداری کنید.
- دو ساعت قبل و یک ساعت بعد از مصرف قرص آسپیرین از مصرف شربت آنتی اسید خودداری کنید.



مرکز آموزشی درمانی امین

خود مراقبتی در داروی آسپرین

جهت استفاده از مطالب آموزشی بیماری خود به سایت بیمارستان امین به آدرس www.mui.ac.ir قسمت آموزش به بیمار مراجعه نمایید.

شناسنامه پمفلت آموزشی	
موضوع	خود مراقبتی در داروی آسپرین
تهیه کننده	نرگس ترکی آفرانی (کارشناس مامایی)
تأییدکنندگان علمی	خانم دکتر عابدی
سمت	داروساز بیمارستانی
تاریخ تهیه	1400
تاریخ بازنگری	1403
نوبت بازنگری-کد پمفلت	صفر PE-FAR-0 6

منابع :

درسنامه برونر و سودارث

کتاب ایران فارما

<https://reference.medscape.com>

عوارض جانبی آسپرین:

- علائم خونریزی برای مثال کبود شدن پوست، خونریزی از لثه، مدفوع خونی یا تیره، ادرار خونی یا کدر باید به پزشک داده شود.
- دربالغین احساس پری درگوشها، وزوز گوش و کاهش یا فقدان شنوایی نشانه مصرف مقادیر زیاد این دارو می باشد که با قطع آن به تدریج بهتر می شود.
- مسمومیت درکودکان شامل علائمی نظیر تنفس طولانی، عمیق و سریع، پریشانی، تغییرات رفتاری، خواب آلودگی، بی حالی، تعریق و یبوست می باشد. درکودکانی که در معرض خطر کم آبی مانند تب، اسهال و ضعف هستند، خطر مسمومیت با این دارو افزایش پیدا می کند.
- امکان بروز واکنش حاد در بیماری که حساسیت به دارو ندارد وجود دارد. در افراد با سابقه حساسیت به آسپرین، آسم، کهیر، سابقه خونریزی معده یا سایر مشکلات گوارشی ممکن است دیده شود.

فراموشی یک دوز دارو:

اگر یک دوز را فراموش کرده اید، هرگاه آن را به خاطر آوردید، هرچه سریعتر مصرف کنید؛ اگر به دوز بعدی بسیار نزدیک باشد، از مصرف آن دوز صرف نظر نموده و از دو برابر کردن دوز دارو اجتناب نمایید.