



شرح بیماری:

- آنتروکولیت نکروزان یکی از شایع‌ترین اورژانس‌های جراحی-پزشکی دستگاه گوارش در نوزادان است.
- اگرچه این بیماری بیشتر در نوزادان نارس رخ می‌دهد ولی احتمال ایجاد آن در نوزادان رسیده نیز وجود دارد.
- آنتروکولیت نکروزان بیشتر قسمت انتهایی روده باریک و ابتدایی روده بزرگ را درگیر می‌کند ولی می‌تواند هر قسمتی از هر دو روده را درگیر کند. در موارد شدید بیماری می‌تواند سایر اعضای بدن را تحت تأثیر قرار دهد. این بیماری در هفته‌های دوم تا سوم زندگی نوزاد نارس رخ می‌دهد.

علائم:

- عدم تحمل غذا، تهوع و استفراغ
- تأخیر در تخلیه معده و افزایش حجم معده
- اسهال آبکی و گاهی خونی همراه با انقباضات، اتساع و سفتی شکمی
- تب و لرز و بالا بودن تعداد گلبول‌های سفید در آزمایش خون
- افت فشار خون گاهی تا حد شوک همراه با نبض‌های ضعیف و ضربان قلب سریع
- کاهش صداهای شکمی
- قرمزی جداره شکم
- دفع خون از روده‌ها
- علائم غیر اختصاصی مانند قطع تنفس.

علل و عوامل خطر:

- عفونت باکتریایی

- هایپوکسمی یا کمبود اکسیژن خون
- عقب ماندگی رشد داخل رحمی
- نارس بودن نوزاد و کم وزن بودن نوزاد
- بیماری‌های قلبی مادر زادی

عوارض احتمالی:

- پارگی روده و ایجاد پریتونیت یا عفونت پرده شکم
- التهاب صفاقی و سوراخ شدگی آن
- شوک و از دست دادن شدید مایعات بدن و مرگ

تشخیص:

- معاینه توسط پزشک و بررسی علائم و نشانه‌ها
- رادیوگرافی شکم
- سونوگرافی

درمان:

- در تمامی موارد بروز این بیماری نیاز است که بیمار بستری شود.
- 70 درصد نوزادان مبتلا نیاز به جراحی و برداشتن روده مبتلا خواهند داشت.

درچه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- در صورت مشاهده علائم بیماری مانند اتساع شکم، تهوع و استفراغ و ... در نوزاد سریعاً به پزشک مراجعه کنید.
- اگر علائم پس از درمان و جراحی مجدد مشاهده شد به پزشک مراجعه کنید.
- در صورت مشاهده عوارض بعد از عمل جراحی مانند تب و ترشحات بدبو از محل عمل.



مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان

آسیب جداره روده نوزاد

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: 1403

منابع: ClinicalKey، WebMD، Mayo clinic