



مرکز آموزشی درمانی امین

معرفی دستگاه سی‌تی اسکن

دستگاه سی‌تی اسکن شامل یک تیوب مولد اشعه ایکس می‌باشد که دور بیمار می‌چرخد و در مدت کوتاهی تصاویری از مقاطع مختلف از ناحیه مود نظر تهیه می‌کند. سی‌تی اسکن جهت مشاهده بهتر اندام‌های داخلی، استخوان‌ها و بافت نرم مورد استفاده قرار می‌گیرد و در موارد اورژانسی چون آسیب دیدگی‌ها، ضایعات داخلی و خونریزی‌ها گزینه تشخیصی خوبی می‌باشد.



نکات ضروری جهت انجام سی‌تی اسکن

1 اشیاء فلزی می‌توانند در کیفیت تصویر شما تأثیر بگذارند. بنابراین بهتر است لباس زیپ‌دار و گیره‌دار، سنجاق سر، جواهرات، عینک، سمعک، دندان مصنوعی و اشیای فلزی را که در قسمت مورد نظر قرار دارند را در آورید.

2 جهت انجام سی‌تی اسکن بدون کنتراست نیاز به آمادگی خاصی نمی‌باشد.

3 به همراه داشتن کلیه مدارک پزشکی قبلی در رابطه با سی‌تی اسکن فعلی اعم از تصاویر رادیولوژی، سی‌تی اسکن، سونوگرافی، جواب پاتولوژی و MRI و به خصوص جواب آزمایشات مربوط به عملکرد کلیه (BUN/creatinine) در صورتی که نیاز به تزریق ماده حاجب می‌باشد، به عنوان ضمیمه پرونده شما الزامی است.

در مواردی که سی‌تی اسکن با ماده حاجب به صورت خوراکی و تزریقی درخواست شود نیاز به آمادگی‌های زیر دارد:

1 در بیماران سرپایی در موقع اخذ نوبت به آنان آمادگی داده می‌شود و موارد عدم انجام تزریق از بیمار سؤال می‌شود.

2 جهت انجام سی‌تی اسکن با تزریق، ارائه جواب آزمایش (BUN/creatinine) بیمار الزامی است.

3 روز قبل، غذاهای سنگین نخورید.

4 تقریباً 3 ساعت قبل از انجام تصویربرداری از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.

5 داروهای خود را طبق برنامه همیشگی تان مصرف کنید؛ البته به جز متفورمین. (قطع این دارو از 48 ساعت قبل از انجام آزمون الزامی است و مصرف دوباره فرص متغورمین به شرط عملکرد طبیعی کلیه‌ها پس از انجام آزمون با تزریق ماده حاجب بلا مانع است).

6 برای بیماران بستری فرم رضایت قبل از تزریق (روز قبل یا چند ساعت قبل) داده می‌شود تا بر اساس شرح حال و سابقه بیماری دستورهای لازم داده شود.

• کنتراندیکاسیون‌های (موارد عدم انجام) سی‌تی اسکن با کنتراست عبارتند از:

- انجام سی‌تی اسکن برای باتوان باردار ممنوع است مگر در شرایط اورژانسی.
- آسم - تنگی نفس، حساسیت مفرط به دارو - مولتیپل میلوما.
- در بیماران با کراتینین بالا
- بیماران با نقص ایمنی تزریق کنتراست در شرایط خاص صورت می‌گیرد.
- در بیماران دیالیزی نوبت بیمار با تاریخ دیالیز مطابقت داده شده و طوری هماهنگی انجام شود که بلا فاصله بعد تزریق بیمار دیالیز شود.
- در آزمون‌هایی که بیماران سنگ صفرا و یا سنگ سیستم ادراری دارند آزمون بدون کنتراست قبل از انجام تزریق و کنتراست خوراکی الزامی است.

نکات مهم:

- ✓ اگر از سابقه آلرژی خود به مواد حاجب و غذاهای خاص باخبر هستید حتماً به پزشک خود اطلاع دهید تا داروهای کاهش‌دهنده بروز واکنش آلرژیک را تجویز نماید. توجه فرمایید این داروها حداقل **۱۲ ساعت** قبل از انجام سی‌تی‌اسکن باید مصرف شوند.
- ✓ هر نوع بیماری که اخیراً به آن مبتلا شدید و یا سابقه آسم، دیابت، بیماری‌های کلیوی و مشکلات تیروئیدی را حتماً به پزشک خود و یا کارشناس انجام‌دهنده سی‌تی‌اسکن اطلاع داده و همچنین در فرم رضایت آگاهانه قید نمایید. عدم اطلاع پزشک و کارشناس مربوطه از بیماری شما ممکن است باعث بروز واکنش‌های آلرژیک خطرناک شود.
- ✓ بیماران محترم در صورت ابتلا به بیماری مسری، مانند هپاتیت، سل، ایدز و بیماری‌های عفونی، مسئول پذیرش را حتماً در جریان بگذارید.
- ✓ در سی‌تی‌اسکن‌هایی که بدون کنتراست انجام می‌گردد نیاز به آمادگی قبلی نمی‌باشد و فقط بایستی هیچ‌شی فلزی در ناحیه عضو مورد نظر نباشد و اگر سی‌تی‌اسکن شکم و لگن بدون تزریق می‌باشد در یک هفته تا ده روز اخیر بیمار سابقه رادیوگرافی‌هایی مانند UGI ترانزیت، باریم انما نداشته باشد.
- ✓ اگر قرار است سی‌تی‌اسکن با ماده حاجب خوراکی هم انجام شود یک تا دو ساعت قبل از نوبتتان باید خوردن ماده حاجب خوراکی را شروع کنید. معمولاً ماده حاجب خوراکی (۳۰CC مگلومین) را در یک بطری آب معدنی یک و نیم لیتری حل می‌کنند و شما هر 10 دقیقه یک بار 1 لیوان می‌کنید. به صورتی که لیوان آخر دقیقاً قبل از انجام آزمون نوشیده می‌شود.
- ✓ تا دو روز پس از انجام سی‌تی‌اسکن، **حتماً روزی ۵ تا ۶ لیوان آب** بنوشید تا ماده حاجب از بدن‌تان دفع شود.
- ✓ مادران شیرده باید تا 24 ساعت پس از تزریق ماده کنتراست به فرزند خود **شیر ندهند**.
- ✓ عکس‌العمل‌های بدن به ماده کنتراست یددار و خطرهای آلرژیک جدی، **بسیار نادر است**. لذا لزوماً واکنش آلرژیک برای شما اتفاق نمی‌افتد. پس آرامش خود را حفظ کنید.
- ✓ بخش تصویربرداری به داروها و وسایل مورد نیاز از نظر انجام اقدامات اورژانسی هنگام بروز واکنش‌های آلرژیک مجهز می‌باشد و به این موارد سریعاً رسیدگی خواهد شد. هیچگونه نگرانی در صورت بروز واکنش‌های آلرژیک نداشته باشید.
- * زنان در صورت احتمال بارداری قبل از انجام سی‌تی‌اسکن **حتماً باید پزشک یا کارشناس مربوطه را با خبر سازند**.
- ✓ داروی تزریقی (حدود ۱۰۰ CC ماده حاجب) از طریق ورید دست تزریق می‌شود.
- ✓ در صورتی که تنها سی‌تی‌اسکن با تزریق درخواست شده باشد ناشتاپی ۲-۳ ساعت قبل از انجام سی‌تی‌اسکن کافی می‌باشد.

تذکر:

1. در صورت مراجعه بیماران اورژانسی، نیازمند همکاری شما در انجام خارج از نوبت این گونه بیماران هستیم و بدین وسیله قبلاً از شما پوزش می‌طلبیم.
2. دقت داشته باشید در صورت تمایل شما به تحويل کلیشه بدون جواب جهت مراجعته به پزشک درخواست کننده، کلیشه به شما تحويل داده می‌شود و در صورتی که خواستار جواب کلیشه خود هستید بعد از بازگشت به مرکز و تحويل کلیشه، زمان انتظار از زمان تحويل کلیشه می‌باشد نه زمان انجام آزمون.
3. جهت دریافت جواب، تحويل برگه رسید الزامی است. لطفاً به تاریخ و ساعت درج شده در رسید جهت دریافت جواب دقت فرمایید.
4. عکس‌های شما نهایتاً تا یک ماه نگهداری می‌شود و پس از آن مرکز هیچ مسئولیتی در قبال تحويل آن‌ها به شما نخواهد داشت.