



شرح بیماری:


- آمپیم به تجمع چرک در یکی از حفرات بدن می‌گویند. عفونتی که منجر به بروز این بیماری می‌شود، معمولاً در فضای اطراف ریه‌ها بین لایه‌های پرده جنب اتفاق می‌افتد.

علائم:

- درد قفسه سینه: این درد می‌تواند از یک ناراحتی مبهم تا درد تند و تیز، متغیر باشد. درد غالباً با سرفه یا تنفس بدتر می‌شود و ممکن است به قسمت پایینی قفسه سینه یا شکم گسترش یابد.
- تنفس تند و سطحی
- لرز
- تب
- خستگی شدید
- سرفه خشک
- تنفس بد بو
- کاهش وزن
- تعرق شبانه

علل شایع:

- عفونت‌های ریه یا قفسه سینه مانند ذات‌الریه، سل یا آبسه ریه
- روی هم خوابیدن ریه یا آسیب به قفسه سینه
- وجود سرطان در سایر نقاط بدن
- بیماری‌های درگیر کننده بافت همبند و عروق مانند لوپوس



مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان

آمپیم

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳

منابع: ClinicalKey، WebMD، Mayo clinic

- بروز عفونت در نقطه‌ای دیگر از بدن که به قفسه سینه گسترش یافته باشد.
 - نارسایی احتقانی قلب
 - بیماری کلیه
 - بیماری کبد
- ## عوامل تشدید کننده:

- تغذیه نامناسب
 - بیماری اخیر
 - سیگار کشیدن
 - خستگی یا کار زیاد
 - آب و هوای سرد و مرطوب
 - محیط زندگی شلوغ و غیر بهداشتی
- ## عوارض احتمالی:

- مننژیت (عفونت پرده پوشاننده مغز)
- پریکاردیت (عفونت پرده دور قلب)
- آندوکاردیت (عفونت دریچه‌های قلب)
- آبسه مغز

تشخیص:

- کشت چرک
- تصویربرداری از قفسه سینه با اشعه ایکس
- سی.تی.اسکن قفسه سینه



درمان:

• توراکوستنتز:

- در این روش پوست ناحیه قفسه سینه شما تمیز و بی حس می شود.
- سوزنی از ناحیه قفسه سینه شما وارد فضای اطراف ریه ها شده و به مایعات تجمع یافته اطراف ریه اجازه خروج می دهد.
- سپس مایع برای بررسی بیشتر به آزمایشگاه فرستاده می شود.

دارو درمانی:

- از آنتی بیوتیک برای مبارزه با عفونت و از استامینوفن برای تخفیف درد می توان استفاده کرد.

جراحی:

- در صورتی که با استفاده از روش های ذکر شده بیمار بهبود نیافت باید جراحی شود.



اقدامات قبل از توراکوستنتز:

- آمادگی خاصی برای این آزمون لازم نیست. شما باید پزشک را از کلیه داروهای مصرفی خود آگاه سازید.
- در صورتی که هر گونه مشکلات مرتبط با خونریزی دارید نیز باید پزشک خود را در جریان قرار دهید.

اقدامات بعد از توراکوستنتز:

- بعد از توراکوستنتز یک تصویر با اشعه ایکس از قفسه سینه شما گرفته می شود.
- در صورتی که پس از آزمون فشارخون و تنفس شما مشکلی نداشته باشد می توانید مرخص شوید.

فعالیت:

- تا چند روز پس از بیماری و تا زمانی که علائم برطرف نشده باشد استراحت کرده و از انجام فعالیت های سنگین اجتناب کنید.
- سپس فعالیت های عادی خود را تدریجاً از سر بگیرید. بهبود کامل حدود دو ماه زمان می برد.

درچه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- تب و لرز
- ظاهر شدن خون در سرفه.
- زیاد شدن درد
- بدتر شدن تنگی نفس
- سرفه خشک و بدون خلط
- تیره شدن بستر ناخن های دست و پا