

## داروی ریواروکسaban چیست؟

ریواروکسaban، زالربان یا آکسابین، یک داروی ضد انعقاد نسل جدید است که جهت درمان و پیشگیری از اختلالات انعقادی که منجر به ایجاد لخته خون در رگ های بدن می شوند، استفاده می شود. این دارو در دوزهای 2.5، 10، 15 و 20 میلی گرم در دسترس می باشد.



## موارد مصرف ریواروکسaban

- درمان ترومبوز وریدی عمیق و آمبولی ریه
- پیشگیری ثانویه از ترومبوز وریدی عمیق و آمبولی ریه در بیماران پرخطر
- پیشگیری از حوادث ترومبولیتیک بعد از جراحی های لگن و زانو
- پیشگیری از سکتة مغزی و آمبولی سیستمیک در بیماران مبتلا به فیبریلاسیون دهلیزی غیر دریچه ای



## مزایای داروی ریواروکسaban

خوراکی بودن دارو، مصرف تنها یک بار در روز، عدم نیاز به آزمایشات مکرر انعقادی و تداخلات کمتر دارو با غذا و دارو ها از مزایای این داروی ضدانعقاد است. در مورد وارفارین که داروی ضدانعقاد دیگری است، میزان دریافت ویتامین K از طریق مواد غذایی می تواند بر اثر ضدانعقادی وارفارین تاثیر قابل توجهی داشته باشد و بیمار را در ریسک ترومبوز یا خونریزی قرار دهد؛ اما در مورد ریواروکسaban چنین تداخلات غذایی مطرح نمی باشد، تنها به علت اینکه جذب دارو همراه با غذا افزایش می یابد، لازم است دوزهای بالای 10 میلی گرم ریواروکسaban بعد از غذا مصرف شود.



## قبل از مصرف ریواروکسaban موارد زیر را به پزشک خود

### اطلاع دهید

- حساسیت شدید به دارو یا سایر ترکیبات فرمولاسیون
- خونریزی فعال ناشی از بیماری، وجود بیماری های کبدی و کلیوی
- بارداری و شیردهی

- مصرف همزمان سایر داروها برای مثال ضدانعقادهایی مانند وارفارین، انوکسپارین و رتپلاز، ضدقارچ های آزولی مانند ایتراکونازول، ضدویروس هایی مانند ریتوناویر، مسکن هایی مانند ایبوپروفن، ضدتشنج هایی مانند فنی توئین، کاربامازپین و فنوباربیتال، آنتی بیوتیک هایی مانند آزیترومایسین، داروهای قلبی مانند دیلتیازم و آمیودارون، داروهای ضدافسردگی مانند فلوکستین و سیتالوپرام و مکمل هایی مانند ویتامین ای و روغن ماهی
- در صورت نیاز به هرگونه جراحی یا سابقه جراحی در چند ماه اخیر در خصوص مصرف دارو با پزشک مشورت نمایید؛ ممکن است نیاز باشد که قبل از عمل جراحی مصرف دارو قطع شود.

## عوارض جانبی ریواروکسaban

- قلبی عروقی: ادم محیطی
- سیستم عصبی مرکزی: سردرد، گیجی، تب
- پوستی: کبودی، خارش، راش
- گوارشی: یبوست، اسهال، درد شکمی، تهوع
- تناسلی ادراری: وجود خون در ادرار
- خونی: خونریزی، ترومبوسیتوپنی، هماتوم، آنمی
- کبدی: افزایش آنزیمهای کبدی و بیلی روبین
- موضعی: ترشح از زخم
- عصبی عضلانی و اسکلتی: درد اندام ها، اسپاسم عضلانی
- تنفسی: خون دماغ شدن، خلط خونین



مرکز آموزشی درمانی امین

# خودمراقبتی در ریواروکسابان

جهت استفاده از مطالب آموزشی بیماری خود به سایت  
بیمارستان امین به آدرس [www.mui.ac.ir](http://www.mui.ac.ir) قسمت آموزش به  
بیمار مراجعه نمایید.

شناسنامه پمفلت آموزشی		
موضوع	خود مراقبتی در ریواروکسابان	
تهیه کننده	خانم خان محمدی	
تأیید کنندگان علمی	خانم دکتر عابدی (داروساز)	
تاریخ تهیه	1400	
تاریخ بازنگری	1403	
نوبت بازنگری - کد پمفلت	اول	PE-HD-07

## در صورت فراموشی یک دوز دارو چه کنیم؟

اگر دوز مصرفی داروی ریواروکسابان را فراموش کردید، در اولین زمان ممکن آن را مصرف کنید. اما اگر نزدیک به مصرف دوز بعدی، به یاد آوردید که دارو را مصرف نکرده‌اید، نیازی به مصرف دو برابر داروی ریواروکسابان نیست و فقط دوز مقرر را مصرف کنید. اگر روزانه ۲ بار این دارو را مصرف می‌کنید و دوز مصرفی خود را فراموش کردید در اولین فرصتی که به یاد آوردید، دارو را مصرف کنید و اگر نزدیک زمان دوز دوم روز به یاد آوردید، مصرف خود را دو برابر کنید و سپس از برنامه تجویز پیروی کنید.

### منابع:

<https://www.fiercebiotech.com/biotech/bayer-s-xarelto-approved-canada>

<https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a611049.html>