

قرص استراموکس یا اتوموکستین

رده درمانی : درمان کننده بیش فعالی و نقصان توجه

تفاوت استراموکس با ریتالین :

درافرادی که به داروهای محرک مانند ریتالین پاسخ

دهند داروی غیر محرک استراموکس تجویز میشود



عوارض جانبی استراموکس :

1-عصبی : سرگیجه و تشنج و سردرد و خواب الودگی

2-گوارشی : بی اشتها و کاهش وزن و یبوست و درد

شکم و سوزش سردل

3-پوستی : راش و زرد شدن پوست

4-تناسلی : قاعدگی درناک و اختلال نعوظ

عوارض جانبی:

در صورت وجود بیماری های قلبی و عروقی، بیماری های فشار خون بالا ، گلوکوم و نارسایی های کبدی می بایست فواید مصرف دارو در برابر مضرات آن سنجیده شود.

این دارو باعث سرگیجه و حساسیت به نور می گردد لذا در صورت مصرف این دارو در هنگام رانندگی و یا کار با دستگاه هایی که نیاز به هوشیاری کامل دارند احتیاط نمایید.

در صورت مصرف این دارو حتماً مرتباً تحت نظر پزشک قرار گیرید.

آزمایشات مربوط به اندازه گیری آنزیم های کبدی و بیلی روبین باید به منظور جلوگیری از ایجاد اختلالات کبدی مرتب انجام گیرد.

در صورت مشاهده تغییر رنگ ادرار ،خارش و یا سوزش حتماً با پزشک خود مشورت نماید.

دارو را دور از دسترس اطفال نگهداری نمایید.

از مصرف داروهای تاریخ گذشته خودداری نمایید.

موارد منع مصرف :

در بیماران با سابقه حساسیت به اتوموکستین یا مواد دیگر موجود در این قرص در افراد با گلوکوم زاویه بسته در بیماران قلبی عروقی پیشرفته در بیماران با تومور غده فوق کلیه

مسمومیت با استراموکس و درمان :

مسمومیت با این دارو ممکن است با علائم تشنج ، خواب الودگی ، تحریک پذیری ، رفتار غیر طبیعی ، عوارض گوارشی

. اختلال بینایی .تاکی کاردی .خشکی دهان و افزایش فشارخون همراه باشد . برای درمان مسمومیت ناشی از اتوموکستین باید معده تخلیه شود و سپس زغال فعال تجویز میشود انتی دوت شناخته شده ای برای اتوموکستین وجود ندارد.

احتیاط :

در صورت مشاهده هریک از علائم فوق به پزشکتان مراجعه کنید :بیقراری و عصبانیت و افسردگی و افکار خودکشی و حمله های درد اور اگر کپسول باز شود محتویات کپسول ممکن است باعث قرمزی و التهاب چشم شود در صورت بروز این عارضه چشمها باید به سرعت با آب شسته شود در بیماران با سابقه صرع و تشنج مصرف این دارو با احتیاط صورت گیرد این دارو ممکن است سبب خواب الودگی و گیجی شود بنابراین هنگام رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به دقت و هوشیاری دارند احتیاط شود

نکات مصرف استراموکس :

اتوموکستین میتواند همراه با فاصله از غذا مصرف شود . همچنین قطع دارو نیاز به کاهش تدریجی دوز ندارد در صورت فراموش کردن یک دوز دارو به محض یاد آوری آن را مصرف نموده و از دوبرابر کردن دوز بعدی دارو خودداری کنید



مرکز آموزشی درمانی امین

مراقبت های دارویی استراموکس (اتوموکستین)



توجهات پزشکی-پرستاری / آموزش به

بیمار - خانواده:

۱- با توجه به احتمال بروز تشنج پیرو مصرف این دارو، تجویز این دارو در بیماران با سابقه صرع باید با احتیاط صورت گیرد.

۲- مصرف آتوموکستین در بیماران با گلوکوما (آب مروارید) زاویه بسته منع مصرف می باشد.

۳- با توجه به احتمال افزایش فشار خون پیرو مصرف این دارو، تجویز آتوموکستین در بیماران با هایپرتانسیون باید با احتیاط صورت گیرد

شناسنامه پمفلت آموزشی	
موضوع	مراقبت های دارویی استراموکس
تهیه کننده	واحد آموزش سلامت
تأیید کننده علمی	خانم دکتر کار احمدی
سمت	روان پزشک
تاریخ تهیه	1401
تاریخ بازنگری	1404
نوبت بازنگری-کد پمفلت	pe-Psych-08

منبع: کتاب خلاصه روان پزشکی کاپلان