



شرح بیماری:

به التهاب لایه خارجی قلب پریکاردیت گفته می‌شود.

علائم:

درد تیز و ناگهانی قفسه سینه که به شانه، پشت و بازو انتشار می‌یابد.
دردی که با دراز کشیدن، سرفه کردن و دم بدتر شده و با نشستن و خم شدن به طرف جلو تسکین پیدا می‌کند.

تب و لرز

خستگی و ضعف

تنفس کوتاه

اضطراب

علل شایع:

عفونت باکتریایی، ویروسی و قارچی

سکته قلبی

ضربات ناشی از جراحی

سل

تومورها

داروها

اشعه

ضربه شدید به قفسه سینه

عفونت با ایدز

بیماری‌های خود ایمنی مانند لوپوس، عوامل ایدیوپاتیکی.

عوارض احتمالی:

تجمع مایع اطراف قلب (افیوژن پریکارد)

تجمع مایعی تشکیل شده از خون، لخته‌های خونی، چرک و گاز اطراف قلب (تامپوناد قلبی)

تنگی نفس

کاهش فشارخون

افزایش فشار سیاهرگی (وریدی)

تشخیص:


تشخیص توسط پزشک با اخذ شرح حال و معاینه دقیق بیمار صورت می‌پذیرد. در صورت نیاز از دیگر روش‌های تشخیصی از جمله موارد زیر استفاده می‌شود:

تست‌های خونی

الکتروکاردیوگرام یا نوار قلب

اکوکاردیوگرام

عکس برداری از قفسه سینه



مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان

التهاب لایه خارجی قلب (پریکاردیت)

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: 1403

منابع: ClinicalKey، WebMD، Mayo clinic

♦ درمان:

- جراحی از طریق برداشتن پریکارد
- جراحی از طریق تخلیه پریکارد احشایی و جداری
- تخلیه مایع اضافی به وسیله سر سوزن (پریکاردیوسنتز)

♦ داروها:

- دارودرمانی از طریق داروهای ضد التهاب غیراستروئیدی، ضد دردها، آنتی بیوتیک ها و استروئیدها انجام می شود.

♦ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- عود علائم بیماری
- درد سینه
- تب
- کوتاهی نفس
- علائم سرما خوردگی
- در صورت مشاهده هرگونه علائم نگران کننده دیگر.

