



شرح بیماری:

آندوکاردیت عبارت است از يك التهاب غير مسري كه عضله قلب، دریچه هاي قلب و پوشش داخلي حفرات يا دریچه هاي قلب را درگیر مي سازد.

علائم:

افرادي كه به التهاب عضله قلب مبتلا مي شوند علائم در آن ها به دو صورت دير هنگام و زود هنگام به صورت زیر بروز مي نمايد.

علائم زود هنگام

خستگی و ضعف

تب، لرز و تعریق زیاد، خصوصاً در شب

کاهش وزن

درد هاي مبهم

وجود صدای غير طبيعي در قلب

علائم دير هنگام

لرز شديد و تب بالا

تنگی نفس در هنگام فعالیت

تورم پاها و شکم

تند يا نامنظم شدن ضربان قلب

علل شایع:

عواملی که در ایجاد التهاب عضله قلب دخالت دارند شامل:

• باکتری ها یا قارچ هایی که وارد خون می شوند، دریچه ها و پوشش داخلی قلب را در کسانی که قبلاً آسیب قلبی داشته اند عفونی می کنند. باکتری ها یا قارچ ها به دریچه ها، عضله و پوشش داخلی قلب آسیب وارد می آورند یا آسیبی که از قبل وجود داشته است را تشدید می کنند.

• عوامل تشدید کننده احتمال خطر

• تب روماتیسمی بیماری مادرزادی قلب

• وارد آمدن آسیب به دریچه هاي قلب

• تزریق مواد آلوده به داخل جریان خون (مثلاً همراه با تزریق وریدی مواد مخدر)

• سوء مصرف الکل



• وجود دریچه مصنوعي در قلب

عوارض احتمالي:

• تشکیل لخته هاي خونی که ممکن است به مغز، کلیه ها، یا احتشای شکمی بروند و باعث بروز عفونت، آبسه یا سکنه مغزی شوند.

• اختلالات ریتم قلب (شایع ترین آن فیبریلاسیون دهلیزی است).

• نارسایی قلب



مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان

التهاب لایه داخلی قلب (آندوکاردیت)

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: 1403

منابع: ClinicalKey، WebMD، Mayo clinic

◆ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- در صورت بروز تب
- سرگیجه یا غش
- بی نظمی در ضربان قلب
- تنگی نفس یا درد قفسه سینه
- ضعف یا فلج ناگهانی در عضلات صورت، تنه یا اندام‌ها
- بروز علائم جدید



◆ تشخیص:

- تشخیص توسط پزشک با اخذ شرح حال و معاینه دقیق بیمار
- صورت می‌پذیرد. در صورت نیاز از دیگر روش‌های تشخیصی از جمله موارد زیر استفاده می‌شود:
- آزمایش خون
- عکس برداری از قفسه سینه
- اکوکاردیوگرام از طریق قفسه سینه
- اکوکاردیوگرام از طریق مری

◆ درمان:

- این بیماری زود هنگام قابل معالجه است، اما بهبود ممکن است هفته‌ها طول بکشد. اگر درمان به تأخیر افتد، عملکرد قلب کاهش یافته و نارسایی احتقانی قلب رخ خواهد داد.
- در صورت عود بیماری جراحی پیشنهاد می‌شود در صورت نیاز در اندوکاردیت دریچه قلب تعویض می‌شود.

◆ داروها:

- در صورت تجویز آسپرین و داروهای ضدالتهاب غیر استروئیدی، دارو را پس از غذا مصرف کنید.
- در صورت مصرف کورتیکواستروئیدها، از قطع خودسرانه دارو خودداری کنید و دارو را با معده خالی مصرف نکنید.
- آنتی‌بیوتیک طبق دستور پزشک در ساعت معین و یک دوره کامل مصرف نمایید.
- در کیف پول خود روی یک کارت فهرست آنتی‌بیوتیک‌های مورد نیاز برای مصرف پیش از کارهای دندانپزشکی و پزشکی را یادداشت کنید.