



❖ عوارض بیماری

به دنبال ایجاد هیدروسفالی ممکن است عوارض زیر در بیمار ایجاد شود:

- ✓ خشکی اندام ها و بی حرکتی
- ✓ اختلال در رشد بدن
- ✓ عقب ماندگی ذهنی
- ✓ عدم تکلم
- ✓ عوارض مربوط به بیهوشی و عمل جراحی
- ✓ عوارض مربوط به شنت مانند عفونت و تورم، قرمزی و حساسیت در سر شنت و ...

❖ در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- ✓ تورم و قرمزی
 - ✓ حساسیت در سر شنت
 - ✓ اختلال در جریان مایع
 - ✓ اشکال در تغذیه
 - ✓ استفراغ
 - ✓ تغییر رفتار و یا منگی
 - ✓ لوچی
 - ✓ بالا بودن مداوم حرارت بدن یا تب
- توجه:** چنانچه در اثر حادثه ای مانند تصادف «شنت» از کار افتاد و علائمی مانند: تحریک پذیری و استفراغ های مکرر، اختلال در هوشیاری و بینایی ایجاد شد، باید بیمار را به سرعت به مرکز درمانی منتقل کرد.

✓ خستگی شدید

✓ تحریک پذیری و یا حتی تغییر شخصیت یا از دست رفتن حافظه و همچنین زوال عقلی

❖ تشخیص

- ✓ هر کودکی که دارای هر یک از نشانه های بالا باشد، باید توسط پزشک ارزیابی شود. این ارزیابی شامل:
- ✓ سونوگرافی
- ✓ سی تی اسکن
- ✓ ام آر آی
- ✓ همچنین از آنسفالوگرافی یا ونتریکولوگرافی برای تعیین محل انسداد مایع مغزی نخاعی می توان استفاده کرد .

❖ درمان هیدروسفالی

- ✓ پزشک با توجه به علائم و شدت بیماری جهت درمان بیمار از موارد زیر ممکن است استفاده نماید:
- ✓ در موارد خفیف بیماری، ترکیبات دارویی که موجب کاهش مایع مغزی - نخاعی می شوند، تجویز می گردد.
- ✓ در موارد پیشرفته، درمان اصلی جراحی است که در آن عامل ایجادکننده بیماری حذف می شود؛ مثلاً: اگر توموری موجب انسداد و ایجاد هیدروسفالی شده باشد، آن را حذف می کنند. گاهی نیز نمی توان عامل ایجادکننده را حذف کرد، به همین علت با ایجاد سوراخی در کف بطن سوم مغزی، بیماری را از بین می برند.
- ✓ کاربردی ترین روش درمان، قرار دادن شنت (لوله ای ظریف) در جمجمه است که مایع اضافی را از مغز به حفره دیگری در بدن منتقل می کند و بدین ترتیب سر به تدریج به حالت طبیعی بر می گردد.
- ✓ درمان توانبخشی: بسیاری از کودکانی که بیماری آنها به موقع تشخیص داده شده و درمان شده اند، با اقدامات بازپروری، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی و کاردرمانی توانسته اند زندگی عادی و طبیعی داشته باشند.