

❖ شرح بیماری ❖

- از علی که فرد لازم است هیسترسکوپی انجام دهد به موارد زیر می توان اشاره نمود:
- ✓ میوم رحمی: علت اصلی هیسترکتومی و شایعترین تومور لگن در زنان است.
 - ✓ خونریزی رحم کنترل نشده
 - ✓ درد لگنی: اگر با منشأ رحمی بوده و به درمان غیر جراحی پاسخ ندهد.
 - ✓ سلطان رحم و تخدمان و ...
 - ✓ بیرون زدگی اعضای تناسلی
 - ✓ اورژانسهاي زایمان مانند: چسبندگی های جفت و خونریزی های بعد از زایمان
 - ✓ بیماری التهابی لگن

❖ روشن انجام هیسترکتومی واژینال ❖

جراح در این روش با برش دادن از درون واژن یا مهبل به رحم دسترسی پیدا می کند و آن را خارج می کند. برش جراحی در داخل بدن است، بنابراین در محل جوشگاه زخم قابل مشاهده ای وجود نخواهد داشت.


❖ داروها ❖

- ✓ در صورت تجویز آنتی بیوتیک، طبق دستور پزشک در فواصل معین و یک دوره کامل مصرف کنید.
- ✓ مصرف مسکن را طبق تجویز پزشک مصرف نمائید.

هیسترکتومی عمل جراحی است که در آن رحم زن برداشته می شود. البته ممکن است دیگر اعضاء مربوطه مانند تخدمان ها، لوله های رحمی و ... نیز به همراه رحم برداشته شوند. هیسترکتومی یا برداشتن رحم معمولاً تنها هنگامی انجام می شود که همه روش ها درمانی دیگر امتحان شده باشد و به نتیجه های نرسیده باشد.

❖ دو روش هیسترکتومی عبارتند از:

- ✓ ابدولینال یا شکمی
- ✓ واژینال: در این روش برداشتن رحم از طریق کانال واژن انجام می شود.
- هیسترکتومی واژینال بدون بی هوشی کامل یا در وضعیت سرپایی انجام می گیرد.



❖ مزایای هیسترکتومی واژینال ❖

انجام هیسترکتومی دارای یک سری از مزایا به صورت زیر می باشد:

- ✓ پس از انجام این عمل یک تا دو روز در بیمارستان بستری می شوید، گاهی این عمل به صورت سرپایی انجام گرفته و چند ساعت بعد از عمل مرخص می شوید.

به دنبال هیسترکتومی واژینال احتمال بروز عوارض به صورت زیر وجود دارد:

- ✓ بی اختیاری ادراری
- ✓ پرولاپس یا بیرون زدگی واژن از بدن
- ✓ ایجاد فیستول یا ارتباط غیرطبیعی میان واژن و مثانه
- ✓ درد مزمن
- ✓ اثرات روحی و جسمی
- ✓ آسیب به اعضای داخلی مانند دستگاه ادراری، مثانه، روده ها

- ✓ جوشگاه زخم قابل مشاهده ای بروی شکم باقی نمی ماند.
- ✓ پس از ۳ تا ۴ هفته به زندگی عادی بازگردید.
- ✓ هزینه های این عمل نسبت به هیسترکتومی شکمی کمتر است.
- ✓ خطر عفونت بعد از عمل کمتر است.