

بیوپسی کبد

			شماره پرونده:
نام خانوادگی:	نام:	بخش:	پزشک معالج:
		اتاق:	
		تخت:	
نام پدر:	تاریخ تولد:	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:
	جنس: ☐ زن ☐ مرد		
بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:			
مراقبت در منزل:			
- پس از انجام این روش ممکن است اندکی درد و قرمزی در محل وارد شدن سوزن احساس کنید که پس از مدتی از بین خواهد رفت. - به مدت دو ساعت پس از انجام بیوپسی، از خوردن و نوشیدن اجتناب کنید و پس از آن می توانید با نظر پزشک خود به رژیم غذایی معمولتان بازگردید. - در صورت مصرف الکل یا نوشیدنی های کافئین دار، آن را از رژیم غذایی خود حذف کنید. - پس از اتمام روش، تا زمان برطرف شدن اثرات بی هوشی، از رانندگی کردن خودداری کنید. - تا 24 ساعت پس از بیوپسی از استحمام خودداری کنید و پس از آن از فشار بر محل انجام عمل خودداری کنید. - تا مدتی از بلند کردن اجسام سنگین و یا انجام فعالیت های شدید خودداری کنید. - زمانی را برای استراحت خود در نظر بگیرید و سعی کنید از افراد دیگری برای انجام وظایف روزانه خود کمک بگیرید. - از خوابیدن روی محل انجام بیوپسی تا مدتی خودداری کنید. - از مصرف دارو بدون اطلاع پزشک خودداری کنید. - جلسات پیگیری نتایج نمونه برداری و ملاقات های بعدی با پزشکتان را دنبال کنید.			
در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید			
- خونریزی از محل بیوپسی - احساس گیجی و کاهش هوشیاری - تنگی نفس ناگهانی - تب بالا - ایجاد لکه و جوش روی پوست - زردی چشم ها یا پوست - باز شدن یا ترشح از محل بیوپسی - سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی			