



مانند سونوگرافی، سی تی اسکن و یا آزمایش خون داشته باشید.

شرح روش:

پزشک معالج ممکن است یک امتحان برای تعیین موقعیت دقیق کبد شما انجام دهد. سپس شما باید به پشت خود دراز بکشید. شما باید دست راست خود را زیر سر و دست چپ را در کنار خود قرار دهید.

سپس، این منطقه برای نمونه برداری با چند محلول تمیز خواهد شد. حوله استریل در سراسر منطقه قرار می‌گیرد.

شما یک بی حس کننده موضعی دریافت می‌کنید. پزشک شما یک تزریق برای بی حسی منطقه انجام می‌دهد. این تزریق شبیه تزریقی است که دندانپزشک برای شما انجام می‌دهد. شما احساس نیشگون گرفتن خواهید داشت و پس از آن احساس سوختن می‌کنید. بعضی از مردم آن را مانند یک نیش زنبور احساس می‌کنند.

ممکن است پزشک به شما بگوید در زمان نمونه برداری، در یک حالت خاص نفس بکشید. ممکن است از شما خواسته شود این روش تنفس را تمرین کنید. یک نفس عمیق بکشید، آن را خارج کنید و سپس آن را نگه دارید. شما نباید برای چند ثانیه در زمانی که بافت کبد برداشته می‌شود، نفس بکشید. پزشک به شما خواهد گفت دوباره چه زمانی شروع به تنفس کنید.

هنگامی که منطقه بی حس است، یک سوزن مخصوص از طریق پوست وارد می‌شود. پزشک یک نیروی اندک بر روی سوزن وارد می‌کند تا زمانی که سوزن وارد شود. شما ممکن است کمی احساس فشار کنید. پس از وارد شدن سوزن، شما ممکن است صدای "کلیک" را هنگامی که بافت برداشته می‌شود، بشنوید. شما ممکن است ناراحتی خفیفی برای چند ثانیه داشته باشید.

در این هنگام پزشک سوزن را خارج خواهد کرد. پانسمان کوچکی روی این منطقه قرار داده خواهد شد.

شرح روش:

جهت انجام این تست از یک سوزن برای خروج یک قطعه کوچک از بافت کبد شما استفاده می‌شود. هیچ برشی برای این آزمون ایجاد نمی‌شود. پس بافت در زیر میکروسکوپ توسط پزشک بررسی می‌شود. این تست کمک به تشخیص اختلالات کبدی می‌کند.

چگونه می‌توانم برای تست آماده شوم؟

دستورالعمل‌های ذکر شده در زیر را دنبال کنید. همچنین شما دستورالعمل‌ها را از پزشک، پرستار، و یا مرکز آزمون خود، دریافت خواهید کرد.

چه چیزی را همراه با خود بیاورم؟

وقتی که شما برای تست می‌آیید، موارد ذکر شده را همراه خود داشته باشید:

نسخه پذیرش از پزشک معالج

کارت‌های بیمه، فرم‌ها، و ارجاع

لیستی از داروهای مصرفی، چه تجویز شده و چه بدون تجویز


لیستی از غذاها و داروهایی که شما به آن حساسیت دارید

یه نفر همراه

اقدامات قبل از عمل:

پزشک در مورد این روش توضیح خواهد داد، از جمله منافع، خطرات و گزینه‌های دیگر. سپس از شما خواسته خواهد شد تا فرم رضایت‌نامه را امضاء کنید. پرستار از شما سوالاتی می‌پرسد و اطلاعاتی که به همراه آورده اید را از شما می‌گیرد. شما در لباس بیمارستان قرار می‌گیرید. سپس خون شما برای آزمایش گرفته می‌شود.

شما ممکن است برخی از روش‌های تشخیصی دیگر،



مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان

بیوپسی (نمونه برداری) کبد از راه پوست


تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: 1403

منابع: ClinicalKey، WebMD، Mayo clinic

• نتایج آزمون در عرض یک هفته به پزشک شما ارسال می شود. پزشک در مورد نتایج با شما صحبت می کند. در بعضی از بیماران، این قرار ملاقات قبل از ترک مرکز آزمون توسط بیمار، گذاشته می شود. سایر بیماران باید با مطب پزشک برای دریافت نتایج خود تماس بگیرند.



داروها:

• با پزشک معالج یا مرکز آزمون در مورد مصرف یا عدم مصرف داروهای ضد التهابی غیر استروئیدی (NSAID) (ایبوپروفن، آسپرین و یا موترین، و یا داروهای ورم مفاصل)، داروهای دیابت، داروهای قلب و فشار خون مشورت کنید.

• یک هفته قبل از نمونه برداری از آسپرین، محصولات شبیه آسپرین مانند آناکین یا بوفیرین و کومادین استفاده نکنید.

چه چیزی را باید به پزشک گزارش کنم؟

• اگر شما هر یک از موارد زیر را دارید، به پزشک یا پرستار اطلاع دهید:

• هر گونه خونریزی یا احساس رطوبت در محل نمونه برداری

• درد شدید در شکم یا ناحیه دیگر

• تنفس با زحمت

• تهوع یا استفراغ

• احساس سبکی سر و یا سرگیجه


• **چه وقت و چگونه می توانم نتایج آزمون را دریافت کنم؟**

اقدامات پس از انجام این روش:

• پزشک معالج ممکن است از شما بخواهد که به سمت راست دراز بکشید. این عمل مانند یک بانداژ فشاری در محل نمونه برداری عمل می کند.

• پرستار فشار خون، نبض و تنفس را اغلب چک می کند. پرستار نیز از نزدیک، محل نمونه برداری را برای هرگونه خونریزی، بررسی خواهد کرد.

• اقامت در مرکز امتحان برای 2 تا 8 ساعت طول میکشد. در طول اقامت خود، رژیم غذایی ممکن است شامل مایعات شفاف یا یک وعده غذایی سبک باشد. طول اقامت و رژیم غذایی به دستور پزشک شما بستگی دارد.



رژیم غذایی و تغذیه:

• شب قبل از آزمون خود، از خوردن و نوشیدن هر چیزی پس از نیمه شب خودداری کنید. اگر پزشک یا مرکز درمانی به شما می گوید که داروهای معمول خود را استفاده کنید، آنها را فقط با جرعه های کوچک آب بخورید.