




- قسمتی از این کاتتر در خارج از بدن شما باقی می‌ماند. کاتتر در محل خود چسب زده می‌شود. پانسمان استریل در محل ورود کاتتر گذاشته خواهد شد.
- اگر الکتروکاردیوگرام نشان دهد که نوک کاتتر در جای درست قرار گرفته است، نیازی به تصویربرداری اشعه ایکس از قفسه صدری نخواهد بود. در صورتی که نمی‌توان از الکتروکاردیوگرام استفاده کرد یا به دلیل پیس میکر، فیبریلاسیون یا فلوتر دهلیزی یا سایر ریتم‌های دهلیزی که برای الکتروکاردیوگرام مناسب نیستند، داشته باشید.

پس از عمل چه اتفاقی می‌افتد؟

- پرستاران از کاتتر مراقبت خواهند کرد. آنها هر هفت روز، پانسمان را عوض خواهند کرد.
- اگر پانسمان کثیف یا شل شد یا اگر پوست اطراف کاتتر قرمز و دردناک شد، به پرستار اطلاع دهید.
- کاتتر به طور معمول شسته می‌شود تا مطمئن شوند که کاتتر باز است. اگر نیاز داشته باشید اطلاعات بیشتری در مورد مراقبت از کاتتر در منزل دریافت خواهید کرد.
- در صورت داشتن هرگونه سوالی در مورد کاتتر درج محیطی کاتتر مرکزی دارید، از پزشک یا پرستار سوال کنید.




PICC چیست؟

- کاتتر مرکزی قرار داده شده در محیط، یک لوله نازک انعطاف پذیر است که در یک ورید در بالای بازو قرار داده می‌شود.
- کاتتر برای گرفتن نمونه خون استفاده می‌شود. شما همچنین می‌توانید از طریق آن مایعات، دارو و مواد مغذی دریافت کنید.
- هنگامی که این وسیله در محل قرار داده می‌شود، نیازی نیست.
- که پوست شما در هر زمانی که پزشک نیاز به چک کردن خون شما یا دادن دارو و مایعات داشته باشد، خراشیده شود.

چگونه کاتتر مرکزی قرار داده می‌شود؟

- این کاتتر ممکن است در هر قسمت دست قرار داده شده و به سمت ورید بالای قلب پیش برود.
- PICC توسط شخص به خصوصی که در این زمینه آموزش دیده، قرار داده می‌شود:
- پرستار
- پزشک
- دستیار پزشک
- کارکنان رادیولوژی
- ابتدا پوست شما در محلی که قرار است کاتتر مرکزی وارد شود، به دقت تمیز می‌شود. پزشک یا پرستار یک سوزن مخصوص را از طریق پوست، وارد می‌کند. کاتتر از طریق این نیدل (سوزن) برای قرارگیری در محل درست، هدایت می‌شود.



مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان

درج محیطی کاتتر مرکزی (C.VP)

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic