

توصیه های بهداشتی در کودک مبتلا به کرونا ویروس

- کامل پوشانده شده باشد استفاده کند و در طول استفاده از ماسک به آن دست نزند.
- در صورت خیس یا کثیف شدن ماسک ، آنرا تعویض کرده و از لمس قسمت جلوی ماسک خودداری نمایید و با آزاد سازی بند های ماسک از پشت گوش ، آنرا در سطله زباله درب دار انداخته و بلا فاصله دستها شست و شو شوند از استفاده مجدد ماسک یا دستکش های یکبار مصرف خودداری کنید.
- طروف غذای بیمار باید از سایرین جدا شود و جدا از طروف بقیه اعضای خانواده شست و شو شود
- سطوحی که بیمار به طور دائم با آن در تماس است ، مثل میز ، تخت ، مبلمان و سایر مکانها های اتاق بیمار و یا نزدیک بیمار که به صورت مکرر لمس می شوند باید به صورت مکرر تمیز و ضد عفونی شوند (ابتدا با آب و صابون شسته شوند و سپس 10 سی سی واکتس را با 90 سی سی آب رفیق کرده و بروی آنها اسپری نمایید)
- دستشویی و حمام باید حد اقل به صورت روزانه با محلول ذکر شده تمیز و ضد عفونی شوند (10 سی سی واکتس و 90 سی سی آب)
- لباس ها و ملحفه بیمار باید روزانه تعویض شوند . ملحفه و لباسهای کثیف باید ابتدا در نایلون سربسته نگهداری شود و در زمان مناسب با صابون رختشویی و یا در ماشین لباسشویی با دمای آب 90 تا 90 درجه شسته و سپس زیر نور خورشید خشک شوند . از تکاندن لباسهای کثیف بیمار خودداری شود و فرد مراقب هنگام دست زدن به لباسهای کثیف بیمار دستکش بپوشد.
- مراقب بیمار از تماس مستقیم با ترشحات تنفسی ، دهانی و مدفوع وی خودداری کند و در صورت نیاز از دستکش یکبار مصرف پلاستیکی و یا لاتکس استفاده نماید.
- مراقب بیمار و یا افراد خانواده باید بعد از هر بار تماس با بیمار و مکان نگهداری وی ، شست و شو و بهداشت دست را انجام دهند .
- کلیه اعضای خانواده از جمله خود بیمار ، بهداشت دست را رعایت کنند . بهداشت دست قبل و بعد از آماده کردن ، خوردن غذا و یا هر زمانی که دست ها آلوده می شوند باید انجام شود . در صورتی که آلودگی دست مشهود نباشد ، می توان از مواد ضد عفونی کننده الکلی استفاده کرد ولی در صورت وجود آلودگی قابل مشاهده بر روی دستها باید به مدت 20 ثانیه دستها با آب و صابون شست و شو شوند و با حolle یکبار مصرف و یا دستمال کاغذی خشک شوند .
- برای جلوگیری از انتشار ترشحات تنفسی ، بیمار باید حتی الامکان در تمامی اوقات بیداری از ماسک استفاده کند در صورتی که پوشیدن ماسک برای کودک امکان پذیر نباشد لازم است ، کلیه اعضای خانواده از جمله خود بیمار به صورت جدی بهداشت تنفس را رعایت کنند .
- برای مثال در زمان سرفه و عطسه ، بینی و دهان خود را با دستمال کاغذی بپوشانند و دستمال پس از استفاده در در یک سطل درب دار دور انداخته شود .
- مراقب کودک در زمان حضور در اتاق بیمار و یا مراقبت نزدیک از وی از ماسک طبی که دهان و بینی به صورت
- افراد در تماس نزدیک (با فاصله کمتر از یک متر) با بیمار مبتلا به عفونت تنفسی (مثلاً عطسه ، سرفه و ...) در معرض خطر ابتلا به عفونت هستند .
- حد اقل دوران جدا سازی تنفسی و تماسی بیماران در منزل پس از ترجیح از بیمارستان تا 14 روز است .
- بیمار تا زمان برطرف شدن کامل علائم بیماری اکیدا ملاقات ممنوع است و باید در منزل بماند .
- بیمار باید در یک اتاق به صورت مجزا به همراه یکی از والدین قرار بگیرد . اتاق بیمار باید دارای تهویه مناسب باشد (در و پنجره های اتاق قابل باز شدن باشد) و پنجره ها جهت گردش هوا به دفعات در طول روز باز شوند .
- در صورتی که اختصاص یک اتاق مجزا به کودک بیمار امکان پذیر نباشد ، بقیه اعضای خانواده باید حداقل یک متر از کودک فاصله داشته باشند . حتماً کودک در رختخواب خودش و جدا از والدین خوابانده شود .
- باید جابجایی و حرکت بیمار محدود شود و فضاهای مشترک (آشپزخانه ، حمام ، توالت و ...) حتی الامکان دارای تهویه مناسب بوده و پنجره ها برای گردش هوا به دفعات در طول روز باز شوند .
- تعداد مراقبین بیمار به حد اقل رسانده شود (حتی الامکان یک نفر که دارای وضعیت سلامت مطلوب بوده و دارای ضعف سیستم ایمنی و یا بیماری زمینه ای نباشد از کودک مراقبت کند .



مرکز آموزشی درمانی امین



راهنمای والدین در نگهداری از کودک مبتلا به کرونا ویروس

جهت استفاده از مطالب آموزشی به سایت بیمارستان
www.amin.mui.ac.ir
نمایند.

شناسنامه پمحلت آموزشی		موضوع
راهنمای والدین در نگهداری از کودک مبتلا به کرونا		
واحد آموزش سلامت (مریم خان محمدی)	نهیمه کننده	تایید کننده علمی
خانم دکتر پور مقدس		سمت
فوق تخصص بیماریهای عغونی اطفال		تاریخ نهیمه
1401		
PE-PED-38	کد پمحلت و بازنگری	

منابع : مقالات 12 می سال 2020 سازمان جهانی بهداشت

- تنفس تند (تعداد تنفس بیش از 60 مرتبه در دقیقه در سن زیر 2 ماه ، بیشتر از 50 مرتبه در دقیقه در سن زیر یک سال، بیشتر از 40 مرتبه در دقیقه برای سن 1 تا 4 سال ، بیش از 30 مرتبه در دقیقه برای سن بالای 5 سال)
 - تنفس سخت (وجود تو کشیدگی زیر قفسه سینه و بین دندوه ها ، ناله ، زنش پره های بینی) کبودی زبان یا لبها یا دور چشم ها ، ناتوانی در خوردن یا آشامیدن عدم برقراری ارتباط در هنگام بیداری ، یا بی قراری بیش از اندازه ، خشکی مخاط دهان و عدم اشک یا کاهش حجم ادرار تشنج ، عود علائم نظیر تب ، تشدید سرفه ها و تنفس تند بعد از یک دوره بهبودی نسبی
 - در صورت بروز هر یک از علائم ذکر شده ، در اولین فرصت به یکی از مراکز مشخص شده جهت ویزیت و مراقبت بیماران مشکوک به کرونا مراجعه نمایید برای اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی زیر مراجعه کنید WWW.CORONAISEFAHAN.IR
 - زباله های بیمار باید به عنوان زباله عفونی در نظر گرفته شود و در سطل درب دار در اتاق بیمار نگهداری شوند و به عنوان زباله عفونی دفع شوند . از انواع مواجه غیر محافظت شده با لوازم آلوده که در ارتباط مستقیم با بیمار هستند نظیر حolle ، روتختی بیمار و ظروف غذایی بیمار خودداری شود
 - براساس توصیه سازمان جهانی بهداشت ، مادران مبتلا به بیماری COVID19 می توانند به شیر دهی خود ادامه دهند . برای این کار بایستی در هنگام شیر دادن به شیر خوار حتما ماسک طبی استفاده کنند و بهداشت دست را رعایت کنند . این مادران حتما باید سایر نکات ذکر شده در راهنمای را به دقت رعایت کنند .
 - مراقبت های لازم هنگام شیردهی مادر مبتلا (یا مشکوک) به کرونا



عالیم هشدار در کودک مبتلا به بیماری تنفسی حاد از حمله کرونا

