


LEEP چیست؟

• LEEP مخفف روش برداشت الکتریکی حلقه ای است. اگر نتایج تست یا بیوپسی یا پاپ اسمیر شما سلول های غیر طبیعی در دهانه رحم (انتهای پایین رحم) را نشان دهد، دکتر شما ممکن است LEEP را توصیه کند. یک روش سرپایی است، بنابراین لازم نیست در بیمارستان بمانید. این کار معمولا در مطب دکتر انجام می شود. LEEP یک درمان موثر برای رشد سلول های غیر طبیعی، به نام دیسپلازی است. دیسپلازی سرطان نیست، اما اگر درمان نشود می تواند به سرطان گردن رحم منجر شود. LEEP، بافت غیر طبیعی را از دهانه رحم شما حذف می کند. در برخی از انواع درمان، بافت های غیر طبیعی از بین می روند. LEEP بافت را حفظ می کند، به طوری که می توان آن را بررسی کرد تا مطمئن شوید که هیچ سرطانی وجود ندارد.

چگونه LEEP انجام می شود؟

• LEEP زمانی انجام می شود که شما پرئود نباشید. این اجازه می دهد که دکتر دهانه رحم را به وضوح ببیند. قبل از عمل، از شما خواسته خواهد شد تا فرم رضایتنامه را امضاء کنید. دکتر شما ممکن است به شما دارو برای جلوگیری از گرفتگی عضلانی بدهد. این روش به خودی خود معمولا تنها چند دقیقه طول می کشد.




در این روش، دکتر شما:

- بی حسی موضعی در دهانه رحم برای بی حس کردن آن قرار دهد.
- دهانه رحم را با یک ذره بین ویژه به نام کلپوسکپ نگاه می کند.
- حذف سلول های غیر طبیعی از دهانه رحم. برای این کار، دکتر از یک حلقه سیم نازک با جریان الکتریکی استفاده خواهد کرد. از آنجا که سیم بسیار نازک است، آسیب بسیار کمی به بافت اطراف آن وارد می شود.
- با قرار دادن خمیر دارو در دهانه رحم برای کمک به جلوگیری از خونریزی در این روش، شما ممکن است کمی گرفتگی خفیف داشته باشید. این گرفتگی ممکن است کمی پس از عمل ادامه داشته باشد.

عوارض:

مشکلات پس از عمل بسیار نادر است، اما ممکن است شامل:

- خونریزی سنگین
- گرفتگی شدید
- برداشتن ناقص بافت غیر طبیعی
- تنگ شدن دهانه رحم
- عفونت
- دهانه رحم ضعیف که ممکن است مشکلات در طی بارداری ایجاد کند.
- برش و یا سوزاندن بافت طبیعی



مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان روش برداشتن الکتریکی حلقه ای (LEEP)

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic

پس از عمل چه اتفاقی می افتد؟

- بعد از این روش، بافت را به آزمایشگاه فرستاده تا مورد مطالعه قرار گیرد. دکتر در ویزیت پیگیری، به شما اجازه می دهد که نتایج را بدانید. هنگامی که دهانه رحم التیام یافت، شما باید به یک یا بیشتر از موارد زیر توجه کنید:
- ترشح ضخیم قهوه ای، سیاه و سفید (نتیجه طبیعی استفاده از خمیر در پایان روش شما)
- ترشحات آبکی که ممکن است بو بدهند.
- دل درد خفیف
- خونریزی خفیف
- خونریزی سنگین تر در طول دوره پریود بعدی

چیزهایی که بعد از بهبودی باید از آنها اجتناب کنید:

- شما می توانید به بسیاری از فعالیت های عادی خود، خیلی زود پس از LEEP بازگردید. برای کمک به التیام دهانه رحم خود، جلوگیری از موارد زیر به مدت 4 هفته پس از عمل:
- مقاربت جنسی
- تامپون
- بلند کردن اجسام سنگین
- ورزش شدید
- با دکتر خود صحبت کنید تا بدانید اگر باید در طول مدت بهبودی، از هر گونه فعالیت دیگری اجتناب کنید.

در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمائید؟

- خونریزی سنگین (خیس شدن بیش از 1 پد در یک ساعت) و یا خونریزی با لخته شدن
- درد شدید پایین شکم
- تب



مراقبت پیگیری:

- شما یک ویزیت پیگیری حدود 4 هفته پس از عمل LEEP خواهید داشت. در آن زمان، دهانه رحم برای درمان بررسی می شود. دکتر به شما نتایج بافتی که به آزمایشگاه فرستاده شده را می گوید.
- برای سال اول پس از عمل LEEP، شما اغلب نیاز به آزمایش پاپ اسمیر، کولپوسکوپی و یا هر دو خواهید داشت. دکتر با شما در مورد دستورالعمل پیگیری شما صحبت خواهد کرد.

