



فرم شماره 2- آموزش به بیمار و خانواده

مراقبت های پس از ترخیص

سوختگی

شماره پرونده:

نام خانوادگی:	نام:	بخش:	پزشک معالج:
نام پدر:	تاریخ تولد:	اتاق:	
	جنس: <input type="checkbox"/> مرد <input type="checkbox"/> زن	تخت:	
	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:	

بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:

مراقبت در منزل:

- جهت جلوگیری از ایجاد یبوست، مقدار کافی مایعات و مواد غذایی پر فیبر مانند میوه و سبزیجات استفاده کنید.
- غذاهای پر پروتئین پر انرژی، میوه، سبزیجات تازه و لبنیات مصرف کنید.
- در صورت سوختگی لب، با چرب کردن از ترک خوردگی آن جلوگیری کنید تا بتوانید راحت تر غذا بخورید.
- از مصرف غذاهایی که باعث می شود خارش شما بیشتر شود (مانند ادویه جات، ترشیجات و ...) پرهیز کنید.
- بعد از ترخیص از بیمارستان بایستی روزانه زخم خود را تمیز کنید. بدین صورت که:**
- ابتدا از حرارت ملایم آب مطمئن شوید. با لیف نرم و صابون بچه (ترجیحا شامپوی بچه) به ملایمت زخم خود را بشوئید.
- سعی شود از صابون عطر دار استفاده نشود.
- با استفاده از پارچه (حوله استفاده نشود) به طریقه گذاشتن و برداشتن (نکشیدن) زخم را خشک کنید.
- با پماد تجویز شده محل سوختگی را چرب کنید.
- 2-3 بار در روز زخم را باید چرب کرد. استفاده از پماد چرب کننده 18-6 ماه ضروری است.
- در هنگام پماد زدن باید ناخن ها را کوتاه کرده و انگشتر را بیرون آورید.
- می توان از دستکش یکبار مصرف (یا کیسه فریزر تمیز) و یا با دست های شسته به صورت یک لایه نازک پماد مالیده شود و به آرامی ماساژ داده شود تا جذب پوست گردد.
- از روسری، چتر، کلاه با لبه های پهن برای سوختگی صورت، دستکش نخی روشن برای سوختگی دست و جوراب نخی برای سوختگی های پا استفاده شود.
- به علت تاثیر نور آفتاب، لامپ های نئون و مهتابی روی پوست سوخته از کرم های ضد آفتاب (3 بار در روز) به مدت 18 ماه استفاده شود.
- به منظور کاهش خارش از لباس های نخی یا پنبه ای، جوراب های نخی و یا حوله ای و از کفش های کتانی نرم به مدت (حداقل 2 ماه) استفاده شود.
- دوش آب سرد بگیرید. با حوله مرطوب پوست را خنک نگه دارید. پوست را با لوسیون های تجویز شده چرب نگه دارید.
- از خاراندن، خراشیدن، سائیدن، ضربه زدن، کشیدن و حرکات خشن خوداری کنید.
- از منابع حرارتی توام با گرد و غبار و خاک دوری کنید. (در هوای آلوده نیز قرار نگیرید)
- به یاد داشته باشد اگر بانداژ یا لباس ضد اسکار شل باشد اثر خود را از دست می دهد و اگر بانداژ سفت باشد باعث ناراحتی، کرحتی، سوزش و تورم خواهد شد. به هیچ عنوان تاول را چه با سوزن و چه با دست نترکانید.
- برای کنترل درد، محل سوخته را در سطحی بالاتر از سطح قلب قرار دهید تا ورم و درد آن کم شود. علاوه بر آن می توانید از داروهای مسکنی مانند استامینوفن و ایبوپروفن استفاده کنید.
- داروها را در فواصل منظم و طبق دستور پزشک مصرف کنید و از قطع دارو بدون اجازه پزشک خودداری کنید.
- در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید**
- ترشح چرکی از محل سوختگی
- تب و درد شدید
- ورم و ایجاد گوشت اضافی
- سایر موارد نگران کننده و یا اورژانسی