



شرح بیماری:

زمانی که ضربه شدیدی به استخوان و یا غضروف بینی وارد شود این احتمال وجود دارد که استخوان در این ناحیه بشکند.

علائم:

علائمی که در زمان شکستگی بینی در فرد بروز می نماید شامل موارد زیر است:

درد بینی

خونریزی بینی

تورم و تغییر رنگ بینی

عدم توانایی در نفس کشیدن از بینی

بدشکلی و تغییر ظاهر بینی

علل شایع:

هر حادثه ای که باعث اصابت ضربه ی مستقیم به بینی فرد شود می تواند از علت بروز شکستگی باشد.

عوارض احتمالی:

به دنبال شکستگی عوارض زیر ممکن است در فرد بروز نماید:

انحراف تیغه بینی

عفونت بینی و سینوس ها

تشخیص:

پزشک جهت تشخیص و درمان شکستگی بینی اقدامات زیر را انجام می دهد:

پس از شرح حال و معاینه ممکن است درخواست عکس رادیولوژی نماید.

زمانی روی می دهد که این باکتری ها بتوانند از طریق یک

شکاف و یا آسیب پوستی که در اثر مواردی چون

جراحی های اخیر، بریدگی ها، زخم های باز، التهاب ها و یا

سایر بیماری های پوستی ایجاد شده اند، وارد بدن شوند.

عوامل خطر:

مصرف داروهای سرکوب کننده ایمنی یا کورتن

بیماری مزمن مانند دیابت شیرین، یا بروز یک عفونت اخیر که موجب کاهش مقاومت شده باشد.

هرگونه آسیبی که به پوست یا یک ضایعه پوستی زمینه ای صدمه برساند.

کاهش ایمنی بدن به علت بیماری نظیر ایدز و یا

سرطان های خون یا داروها

مصرف تزریقی مواد مخدر

سوختگی زخم حاصل از عمل جراحی

عوارض احتمالی:

مسمومیت خون، در صورتی که باکتری ها وارد جریان خون شوند.


عفونت مغز یا مننژیت، در صورتی که سلولیت در ناحیه

مرکزی صورت رخ دهد.

عفونت عضله و بافت مجاور در زیر ناحیه سلولیت شده

پیشگیری:

از وارد آمدن صدمه به پوست اجتناب کنید.



بینی شکسته بینی سالم

مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان

شکستگی بینی

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: 1403

منابع: ClinicalKey, WebMD, Mayo clinic