


فتق اینگوینال چیست ؟

- فتق یک سوراخ مادرزادی یا اکتسابی است که در جدار شکم ایجاد می شود و ممکن است محتویات شکم نظیر روده باریک از طریق آن سوراخ بیرون بزند و بعضی وقتها به شکل یک حباب زیر پوست کودک شما به وجود می آید .
- اگر کودک شما فتق دارد ممکن است شما در کشاله ران او تورم مشاهده کنید.
- فتق در پسرها شایعتر از دخترها است و در بچه های نارس هم بیشتر دیده می شود
- فتق ممکنست یک طرفه یا دو طرفه باشد



آیا عمل جراحی در فتق ضروری است ؟

- جراحی برای بستن سوراخ ضروری است بدون جراحی ممکن است محتویات شکم از طریق این سوراخ بیرون بیاید و گیر بیفتد و آن قسمت از روده سیاه شده و از بین برود.
- کودک من چند روز در بیمارستان بستری خواهد بود ؟
- عمل جراحی فتق نیازی به بستری چند روز قبل عمل ندارد معمولاً یک روز قبل عمل بستری شده و روز عمل هم در صورت نداشتن مشکل خاص مرخص خواهد شد.

قبل عمل چه اقداماتی لازم است؟

- از حدود 4-8 ساعت قبل عمل (بسته به سن کودک) چیزی از راه دهان به کودک داده نخواهد شد.
- انجام یک سری آزمایشات خون هم ضروری است.

اگر بچه ای تب دار باشد باز هم عمل را انجام می دهید؟

در صورت داشتن تب و علائم سرما خوردگی بهتر است عمل کودک شما تا بهبودی کامل به تاخیر بیفتد .

در طول عمل جراحی چه اتفاقی خواهد افتاد؟

- نوع بیهوشی کودک از نوع بیهوشی عمومی است .
- جراح یک سوراخ کوچک روی شکم باز می کند و بعد از بستن سوراخ فتق مجدداً آن را می بندد .
- عمل 1-1.5 ساعت طول می کشد .

چه زمانی کودک من قادر خواهد بود که به منزل برود ؟

- وقتی کاملاً بیدار شده باشد که حدوداً " 3-2 ساعت طول می کشد.
- بتواند به خوبی مایعات بخورد.
- ضربان قلب و تنفس های طبیعی داشته باشد.
- بعد از عمل ادرار کرده باشد
- استفراغ و خونریزی نداشته باشد

چطور می توانم از کودکم در منزل مراقبت کنم؟

کنترل درد : کودک شما ممکن است چند روز اول بعد از عمل به مسکن نیاز داشته باشد که توسط جراح داروی مسکن نوشته می شود.

- این عمل نیازی به استفاده از آنتی بیوتیک ندارد.

تغذیه:

کودک شما همه چیز را می تواند بخورد ولی برای کارکرد بهتر شکم ترجیحاً مایعات بیشتری داده شود.

فعالیت:

عمل فتق هیچ محدودیتی برای کودک شما ایجاد نمی کند ولی به هر حال باید از بازیهای خشن مثل دوچرخه سواری و شنا به مدت دو هفته پرهیز کنند.

حمام دادن:

48 ساعت بعد از عمل کودک شما می تواند حمام کند .
پانسمان: 48 ساعت بعد از عمل پانسمان اولیه برداشته شود و دیگر نیازی به پانسمان مجدد نیست.

بخیه ها:

7-10 روز بعد از عمل بیمار توسط جراح ویزیت می شود و بخیه ها برداشته می شود.

- تورم ناحیه فتق در عرض چند روز بر طرف خواهد شد

در موارد زیر باید سریعاً به پزشک مراجعه کنید:

وقتی که کودک :

- دردی دارد که با هیچ مسکنی بهتر نمی شود .
- تب بالای 38 درجه دارد .



مرکز آموزشی درمانی امین

جراحی فتق در اطفال



جهت استفاده از مطالب آموزشی به سایت بیمارستان مراجعه
نمایید. www.amin.mui.ac.ir

شناسنامه پمفلت آموزشی	
موضوع	فتق در کودکان
تهیه کننده	واحد آموزش سلامت
تأیید کننده علمی	دکتر مهردادحسین پور
سمت	فوق تخصص جراحی اطفال
تاریخ تهیه	1401
تاریخ بازنگری	1404
نوبت بازنگری-کد پمفلت	PE-PED-43

منبع: کتاب کودکان مارلو ، برگرفته از بسته خدمتی نظام مراقبت
از شیرخواران پر خطر مرخص شده از بخش های مراقبت ویژه
نوزادان-اداره سلامت نوزادان وزارت بهداشت درمان و آموزش
پزشکی

- خونریزی از محل عمل دارد که با 5 دقیقه فشار مسقیم قطع نمی شود .
- از محل زخم ترشح چرکی دارد .
- ناحیه وسیعی از اطراف زخم قرمز شده باشد.
- در طول 12 ساعت ادرار نداشته باشد.

این مطلب بر پایه آخرین اطلاعات در دسترس پزشکی و پرستاری تدوین شده است و توسط پزشکان، پرستاران و والدین دیگر مرور شده است ولی برای کودکی ممکن است ملاحظات خاصی لازم باشد که باید بر پایه تشخیص و وضعیت اختصاصی وی تدوین شود لذا این مطلب تنها بعنوان خطوط راهنما بوده و به هیچ وجه جایگزین توصیه های پزشک معالج کودک شما نمی باشد.

