

قرص کلوزاپین

کلوزاپین از داروهای ضدجنون است که برای درمان نشانه های شدید اسکیزوفرنی (جنون جوانی) در افرادی که به داروهای دیگر پاسخ نمی دهند، به کار برده می شود. علاوه بر این برای کمک به کاهش احتمال رفتار خودکشی در افراد مبتلا به جنون جوانی مورد استفاده قرار می گیرد. کلوزاپین به شکل قرص های سفید رنگ 25 و 100 میلی گرمی موجود می باشد. این دارو به راحتی از دستگاه گوارش جذب می شود و حدود 4 تا 12 ساعت تاثیر آن باقی می ماند، سپس از راه ادرار و مدفوع دفع می شود.



مقدار مصرف کلوزاپین

مقدار مصرف دارو توسط پزشک تعیین می شود ولی مقدار مصرف معمول این دارو به شرح زیر می باشد:

در بزرگسالان ابتدا 12/5 میلی گرم یک یا دوبار در روز مصرف می شود که در صورت تحمل بیمار بتدریج افزایش می یابد و مقدار مصرف روزانه با صلاحدید پزشک تا 900 میلی گرم افزایش می یابد.

تداخلات دارویی

مصرف همزمان داروهای زیر اثر کلوزاپین را مختل کرده یا باعث افزایش عوارض آن می شود:
سایمتدین، سیتالوپرام، ریفامپین، داروهای فشارخون، داروهای ریتم قلبی، آنتی بیوتیک ها، آتروپین، اریترومايسين، داروهای ضد اضطراب و خواب
آور، کاربامازپین، لیتیموم، فلوکسیتین، وارفارین، دیگوکسین.

در موارد زیر دارو را با نظر پزشک استفاده کنید:

بیماری های خونی، بزرگی پروستات یا ادرار کردن با مشکل، بیماری های قلبی عروقی، انواع صرع، آب سیاه چشم، بیماری کبدی و کلیوی، سابقه انسداد روده ای، سابقه بیماری های عفونی، بیماری فنیل کتونوری

پس پزشک خود را درباره هرگونه بیماری جسمی زمینه ای مطلع سازید.

این دارو برای جنین مضر نیست ولی در صورت بارداری یا قصد حامله شدن با پزشک خود مشورت کنید.

در صورت بروز مسمومیت و علائم زیر به پزشک معالج مراجعه کنید:

صرع، گیجی، خواب آلودگی شدید یا کما، تند یا کند شدن ضربان قلب، توهم، افزایش زیاد ترشح بزاق دهان، تنفس سریع یا نامنظم، عصبانیت و بی قراری.

توصیه

- ❖ در طول درمان با این دارو می بایست در هجده هفته اول هر هفته و سپس ماهی یکبار آزمایش شمارش سلول های خونی انجام شود.
- ❖ برای تغییر وضعیت از حالت نشسته یا درازکش به ایستاده به آرامی بلند شوید و قبل از برخاستن پاهای خود را آویزان کنید.
- ❖ در زمان مصرف این دارو از رانندگی و کار با وسایلی که نیاز به هوشیاری کامل دارند بپرهیزید.
- ❖ در صورت بروز عفونت و علائم آن (تب، گلودرد، علائم شبه آنفولانزا) و علائمی نظیر لرزش، ضعف، بی قراری و زخم های مخاطی به پزشک مراجعه کنید.

مراقبت های مربوط به مصرف دارو

- ❖ برای جلوگیری از خشکی دهان، بطور منظم دهان خود را با آب بشویید، مایعات فراوان مصرف کنید، آدامس بدون شکر بجوید.
- ❖ هیچ گاه دارو را خودسرانه قطع نکنید.
- ❖ بمنظور کاهش یبوست، مصرف مایعات وحجم رژیم غذایی را افزایش دهید و برای کاهش عوارض گوارشی دارو را با غذا یا لیوانی پر از آب مصرف کنید.
- ❖ در صورتی که یک نوبت از مصرف دارو را فراموش کردید، به محض به یاد آوردن، آن را میل کنید ولی اگر تقریباً زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد فقط همان نوبت را میل کنید و از دوبرابر کردن آن خودداری کنید.
- ❖ در صورت عدم مصرف دارو به مدت 4 روز یا بیشتر پیش از مصرف باید به پزشک اطلاع دهید.
- ❖ دارو را دور از دسترس اطفال و در مکانی به دور از رطوبت و دمای زیر 30 درجه نگهداری کنید.



مرکز آموزشی درمانی امین

قرص کلوزاپین



منبع: ایران فارما

شناسنامه پمفلت آموزشی	
موضوع	قرص کلوزاپین
تهیه کننده	واحد آموزش سلامت
تأیید کننده علمی	آقای دکتر حق شناس
سمت	روان پزشک
تاریخ تهیه	1400
کد پمفلت	PE-PSY -13

منبع: ایران فارما

جهت استفاده از مطالب آموزشی به سایت بیمارستان
مراجعه نمایید. www.amin.mui.ac.ir