

## هشدارها:

نوزادانی که ریسک بالای هیپوگلسمی دارند ( شامل : وزن تولد کمتر از 2500 گرم و بیشتر از 4000 گرم ، توقف رشد داخل رحمی ، چند قلوبی ، نوزادان مادران دیابتی ، نوزادان بستری که از راه دهان تغذیه نمیشوند و سرم میگیرند ) لازم است گلوکز سرم آنها را در عرض 1 ساعت از تولد سنجیده و سپس هر 2 ساعت برای 6 ساعت اول و بعد از آن تا پایان 24 ساعت اول 6 ساعت این کار انجام شود.

در نوزادان پر مخاطره که دارای قند طبیعی هستند شروع درمان خوراکی یا گاوаш با شیر خشک یا با شیر مادر در ساعت اول تا سوم آغاز می گردد و با فواصل 2 تا 3 ساعتی تکرار می شود و این کار برای 48-24 ساعت انجام می گیرد.

در صورتی که تغذیه خوراکی به خوبی تحمل نشود و در صورتی که هیپوگلیسی گذرا و بدون علامت نوزاد ایجاد شود، انفوزیون داخل وریدی گلوکز آغاز می شود.

علامت به ترتیب شیوع عبارت است از:

- لرزش
- دوره های سیانوز (کبدی)
- تشنج
- قطع تنفس یا افزایش ضربان قلب
- گریه ضعیف
- سستی یا بی حالی
- بد غذا خوردن
- حرکات چرخشی چشم
- دوره های تعریق
- رنگ پریدگی ناگهانی
- کاهش دمای بدن
- نارسایی و ایست قلبی نیز رخ می دهد.

## راههای تشخیص

از آنجایی که این علامت بالین علل مختلفی می تواند داشته باشد لازم است سطح گلوکز (قندخون) سرم اندازه گیری شود و مشخص شود که آیا با ترشح گلوکز به مقدار کافی و رساندن آن به میزان

طبیعی این علامت از بین می روند؟

هیپوگلسمی (افت قند خون) نوزادی با مقادیر مشخص

تعریف می شود.

قند خون نباید کمتر از 50 mg/dl باشد.

نوزادان در خطر افت قند خون اکثراً در 2 دسته بزرگ قرار می گیرند.

■ نوزادان با کاهش ذخیره

■ نوزادان با افزایش مصرف قند



علامت:

شروع علامت از چند ساعت تا یک هفته بعد از تولد تغییر می کند.

# هیپوگلایسمی (افت قند خون)



مرکز آموزشی درمانی امین

شناسنامه پمفت آموزشی	
هیپوگلایسمی (افت قند خون)	موضوع
واحد آموزش سلامت	تهییه کننده
دکتر رفاهی	تأیید کننده علمی
مدیر گروه نوزادان	سمت
1401	تاریخ تهییه
1405	تاریخ بازنگری
PE-PED-27	نوبت بازنگری-کد پمفت
دوم	



منبع: کودکان مارلو

مراقبت‌های پرستاری:

سطح گلوکز سرمی (قند خون) را بعد از شروع درمان باید هر ۲ ساعت سنجید تا در چندین آزمایش بیش از ۵۰ میلی گرم در دسی لیتر باشد بعد از آن باید سطح خونی را هر ۶-۴ ساعت سنجید و درمان را به تدریج کاهش دهیم و در صورتی که سطح گلوکز خون برای ۲۴-۴۸ ساعت طبیعی بود و نوزاد بدون علامت باشد آن را قطع کنیم درمان معمولاً برای چند روز تا یک هفته و ندرتاً چندین هفته لازم است.

جهت استفاده از مطالب آموزشی به سایت بیمارستان مراجعه نمایید.  
[www.amin.mui.ac.ir](http://www.amin.mui.ac.ir)

