

# کلر پرمازین



لارگاکتیل یا نورمازین یا کلرپرمازین

گروه دارویی : خواب آور و ضد جنون

شکل دارو: قرص 25 تا 100 میلی گرم و آمپول 50 میلی گرم

روش عملکرد: بلوك گیرنده های پس سیناپسی

دوپامینی در مژولیمیک مغز

موارد مصرف: در اختلالات روانی مانند جنون جوانی، افزایش خلق، درمان هیجان های بالا، ضد تهوع و ضد سکسکه

روش جذب: از دستگاه گوارش جذب می شود و سپس از راه ادرار و صفرا دفع می شود.

## تداخل دارویی:

قرص کلرپرمازین با بعضی داروهای قلبی و داروهای کاهنده فشار خون و دیگر داروهای روانپزشکی تداخل دارد. بنابراین به هر پزشکی که مراجعه می کنید حتماً ذکر کنید که این دارو را مصرف می کنید.

## صرف در دوران حاملگی و شیر دهنی:

صرف مقدار کم آن برای مادر و جنین بی خطر است اما در اواخر حاملگی و حین زایمان می تواند سبب عوارض جانبی در نوزاد شود. در حاملگی حتماً با پزشک خود مشورت کنید.

کلرپرمازین می تواند در شیر نفوذ کند و به نوزاد آسیب بزند.

## عوارض جانبی دارو:

شایعترین عارضه در شروع درمان خواب آلودگی است.

سایر عوارض:

- گیجی و عدم تعادل
- افت فشار خون
- خشکی دهان و بینی
- درد ناحیه شکم
- یبوست

## سمومیت با مقدار بیش از حد دارو:

خشکی دهان، درد ناحیه شکم، بی قراری، سفتی عضلات، حرکات مکرر غیرارادی، حملات صرع، تب خیلی بالا، تغییر ضربان قلب، خواب آلودگی شدید و ضعف

با وجود علایم فوق حتماً به اورژانس مراجعه کنید.

## فراموش کردن نوبت مصرفی:

سریع مقدار فراموش شده را پس از یادآوری مصرف کنید.

اگر زمان یاد شده نزدیک زمان بعدی دارو بود، دوز قبلی را مصرف نکنید و مقدار جدید را مصرف کنید.





مرکز آموزشی درمانی امین

## کلر پرمازین



### شناسنامه پمفت آموزشی

قرص کلر پرمازین	موضوع
واحد آموزش سلامت فاطمه خانی	تهیه کننده
دکتر روان پزشک	تأثید کننده علمی
روان پزشک	سمت
1401	تاریخ تهیه
PE-PSY-23	کد پمفت

كتاب خلاصه روان پزشکی کاپلان

❖ بعد از یک دوره طولانی از مصرف کلرپرمازین هرگز به صورت خودسرانه و ناگهانی دارو را قطع نکنید چون ممکن است دچار عوارض ترک این دارو شوید که شامل: تهوع، استفراغ، احساس ضعف شدید

❖ به علت عارضه افت فشار خون دارو از تغییر وضعیت ناگهانی مثل سریع نشستن یا بلند شدن یا از حالت خوابیده بلند شدن سریع و بلافصله راه رفتن جلوگری کنید تا دچار احساس سرگیجه و عدم تعادل نشوید.

❖ در زمان رانندگی یا انجام کارهایی که نیاز به دقق و هوشیاری کامل دارد مراقب باشید.

❖ حتماً مایعات کافی (صرف 8 تا 12 لیوان اب، چای کمرنگ یا آبمیوه) در طول روز مصرف کنید.

❖ دوره درمان دارو باید کامل کنید. این دارو نباید بیش از مقدار تجویز شده مصرف شود.

### آموزش به خانواده:

❖ برای حصول اثرات درمانی مطلوب ممکن است چند هفته زمان مورد نیاز باشد.

❖ قبل از قطع دارو به پزشک مراجعه کنید.

❖ در صورت نیاز به جراحی یا درمان اورژانس، پزشک باید از مصرف این دارو آگاه گردد.

❖ این دارو باعث خشکی دهان می شود. از آدامس یا آبنبات بدون قند استفاده کنید. در صورت تداوم خشکی بیش از دو هفته به پزشک مراجعه کنید.

❖ این دارو بعضی از آزمایشات شما را غیر طبیعی می کند. به پزشک خود در مورد مصرف این دارو اطلاع دهید.

❖ از قرار گرفتن در معرض نور خورشید اجتناب کنید، چون کلرپرمازین یا نورمازین پوست شما را به نور خورشید حساس می کند و آنتاب سوختگی رخ می دهد. برای جلوگیری از افتتاب سوختگی لباسهای پوشیده و محافظت در برای نور خورشید، کلاه، عینک و کرم های ضد آفتاب استفاده کنید.