

کاتتر موقت (اکسس) چیست؟



یکی از راههای دسترسی عروقی موقت در همودیالیز می باشد. وسیله ای است ۷ سانت که در رگ های بزرگ بدن مثل ژوگولار (در گردن) یا فمورال (در قسمت کشاله ران) گذاشته می شود و از طریق آن خون بیرون کشیده شده و تصفیه انجام شده و سپس از راه دیگر آن خون به بدن برگردانده می شود.


اکسی که در گردن گذاشته می شود معمولاً 6-8 هفته قابل استفاده است ولی کاتتری که در قسمت کشاله ران گذاشته می شود حدود یک هفته قابل استفاده است.

کاتتر دائم چیست؟



یکی از راههای دسترسی عروقی دائم در همودیالیز کاتترها در سیاهرگ قفسه سینه کار گذاشته می شوند.

کاتتر دائم برای کدام بیماران گذاشته می شود؟



در بیمارانی که امکان دسترسی شریان وریدی را ندارند ایجاد می گردد.

• بچه های کوچک

• دیابتی ها

• بیمارانی با بیماری عروقی پیشرفته

• بیماران چاق

• بیمارانی که چندین بار تحت عمل جراحی برای دسترسی به عروق قرار گرفته اند می باشد.

به موارد زیر دقت و توجه کنید:

• هنگام استفاده از کاتترها شرایط استریل را رعایت کنید.

• پرستار و بیمار حتماً از ماسک استفاده کنند.

• محل ورود کاتتر از نظر علائم تورم، خونریزی، ترشح و

پاره شدن بخیه ها کنترل شود.

• هیچ گونه خونگیری و تزریق دارو و وصل سرم از کاتتر انجام نشود.

• از ایجاد کشش و ضربه به کاتتر به خصوص هنگام خواب و یا دیالیز جلوگیری کنید.

• در صورت جابجا شدن کاتتر هرگز آنرا به جلو یا عقب حرکت ندهید.

• از گذاشتن گیره روی شاخه کاتتر خودداری کنید.

• در صورت خونریزی زیر پوست، ورم و اختلالات تنفسی به پزشک مراجعه کنید.

• مراقب پیچ خوردگی و تا خوردگی کاتتر باشید.

• از دستکاری و باز کردن کلیپس ها خودداری کنید.

• مراقبت و حفظ پانسمان کاتتر تا مدت 15 روز و پانسمان کاتتر با هر دیالیز تعویض شود و از نظر عفونت چک شود.

• موقع تعویض پانسمان از پماد موپروسین استفاده کرده و با یک گاز خشک پوشانده شود .

• ترمیم کاتتر حداقل 15 روز و برای بیمارانی که دیابت دارند معمولاً 30 روز طول میکشد.

•

• هنگام وصل شدن به دستگاه گذاشتن یک گاز استریل زیر محل اتصال لامین های کاتتر به لامین های ست دیالیز.

• شستن دست ها، پوشیدن دستکش، زدن ماسک برای پرستار الزامی است.



مرکز آموزشی درمانی امین

مراقبت از کاتتر دائم (پرم کت) و موقت

بخیه های روی سینه زیر یک ماه کشیده نمیشود و بنابراین در صورت باز شدن نیاز به بخیه مجدد دارد .

اگر دریچه کاتتر باز شد یا افتاد چه باید کرد؟

بیمار و خانواده باید بدانند که اگر دریچه های کاتتر باز شد و یا افتاد ، مجددا نباید آن را استفاده کنند ، بلکه بایستی هر چه سریعتر برای بستن دریچه کاتتر به صورت استریل به بخش دیالیز یا اورژانس مراجعه نمایند .

در صورت مراقبت صحیح و خون دهی مناسب برای انجام دیالیز ، این کاتتر تا 2 سال قابلیت استفاده دارد.

شناسنامه پمفلت آموزشی	
موضوع	مراقبت از کاتتر دائم و موقت
تهیه کننده	مریم خان محمدی
تأیید کننده علمی	دکتر محمدی
سمت	فوق تخصص عروق
تاریخ تهیه	1402
تاریخ بازنگری	1405
نوبت باز نگری و کد پمفلت	صفر PE-ves-04

منبع: برونر وسودارث

جهت استفاده از مطالب آموزشی به سایت بیمارستان مراجعه

نمایید. www.amin.mui.ac.ir

• قبل از وارد کردن سوزن به داخل گرافت توسط پرستار از ضدعفونی شدن محل مطمئن شوید.

• شایع ترین عارضه گرافت عفونت است. در صورت مشاهده علائم عفونت به پزشک مراجعه کنید.

علائم عفونت محل کاتتر چیست ؟

ضعف و بی حالی عمومی

درد ناحیه ورود کاتتر

ورم و حساسیت محل کاتتر

قرمزی و ترشح موضعی از محل ورود کاتتر

زمان حمام پس از تعیبه کاتتر

تا زمان ترمیم خروجی کاتتر می توانید فقط دوش بگیرید . برای این کار قبل از مراجعه به بخش دیالیز دوش گرفته و بلافاصله پانسمان در بخش توسط پرستار تعویض شود.

بعد از ترمیم محل ورود کاتتر ، معمولا 3 تا 4 روز بعد از عمل ، میتوانید به حمام بروید و نیازی به پانسمان بعد از حمام ندارید ولی باید از غوطه وری کاتتر در آب (مثل استخر رفتن ، شنا کردن و خوابیدن در وان) خودداری کنید.

زمان کشیدن بخیه ها

بخیه های روی گردن، یک الی دو هفته بعد باید کشیده شود .