



شرح بیماری

عبارت است از کاهش فعالیت غده تیروئید که باعث کاهش تولید هورمون‌های تیروئیدی می‌شود. غده تیروئید يك غده پروانه‌ای شکل در جلوی گردن است. تقریباً تمام فرایندهای سوخت و ساز بدن تحت تأثیر هورمون‌های تیروئیدی قرار می‌گیرند. کم‌کاری تیروئید در هر دو جنس و در هر سنی رخ می‌دهد، اما در زنان میانسال شایع‌تر است.

علائم

اکثر بیماران چندین مورد از علائم زیر را دارا هستند:

- خستگی
- افزایش حساسیت به سرما
- یبوست
- خشکی پوست
- افزایش وزن غیرقابل توجیه
- پف کردن صورت
- خشن شدن صدا
- ضعف ماهیچه‌های بدن
- افزایش کلسترول خون
- درد، خشکی و یا ورم مفاصل
- خشکی، درد و حساسیت مفاصل
- ریزش مو
- کاهش ضربان قلب
- افسردگی

علل شایع

عللی که باعث ایجاد کم‌کاری تیروئید می‌شود گاهی ناشناخته است ولی شایع‌ترین علل عبارتند از:

- بیماری‌های خود ایمنی، که در طی آنها دستگاه ایمنی بدن عملکرد غیرطبیعی دارد و به غده تیروئید حمله می‌برد.
- درمان با ید رادیواکتیو
- جراحی برای درمان پرکاری تیروئید

کمبود ید




- کمبود ید در رژیم غذایی
- کاهش فعالیت غده هیپوفیز، که ترشح‌کننده هورمون محرک تیروئید است.
- داروهایی مانند لیتیوم که از فعالیت تیروئید می‌کاهند.

عوارض احتمالی

از عوارضی که به دنبال این بیماری در فرد ایجاد می‌شود به موارد زیر می‌توان اشاره نمود:

افزایش استعداد فرد در ابتلا به عفونت‌ها



مرکز آموزشی درمانی امین اصفهان

کم‌کاری تیروئید

تهیه کننده: واحد آموزش سلامت

تایید کننده: کمیته آموزش بیمار

تاریخ تهیه: ۱۴۰۳

منابع: ClinicalKey، WebMD، Mayo clinic



- عوارض دارویی
- ناباروری

تشخیص

- تشخیص توسط پزشک با اخذ شرح حال و معاینه دقیق بیمار صورت می پذیرد. در صورت نیاز از دیگر روش های تشخیصی از جمله موارد زیر استفاده می شود.
- آزمایش خون از نظر هورمون های تیروئیدی: با آزمایش می توان تشخیص کم کاری تیروئید را تأیید کرد اما نمی توان مشخص کرد که چه میزان هورمون برای درمان لازم است.
- اهداف درمان عبارتند از تجویز هورمون تیروئید و شناسایی علائم برای پیشگیری از زیاد بودن یا کم بودن مقدار داروی تجویز شده

درمان

- معمولاً بیماری با دادن هورمون تیروئید و تنظیم دقیق مصرف آن قابل درمان است.
- هورمون درمانی عبارت است از فراهم آوردن هورمون تیروئید به اندازه کافی برای بدن تا کارایی عملکردهای طبیعی بدن حفظ شود. امکان دارد تا چندین ماه نیاز به ارزیابی پزشکی وجود داشته باشد تا مقدار مناسب هورمون تیروئیدی که باید داده شود معلوم شود. در صورتی که درمان بدون هماهنگی پزشک قطع شود، ممکن است بیماری عود کند.

فعالیت

محدودیتی برای آن وجود ندارد، تا حدی که می توانید فعالیت خود را حفظ کنید. بهداشت فردی رعایت و از تماس با بیماران عفونی خودداری شود و شرایط ایجاد استرس را کاهش دهید. به دلیل تخمک گذاری نامنظم، از روش های ضدبارداری مطمئن استفاده کنید.

رژیم غذایی و تغذیه

غذاهای دریایی مانند میگو، ماهی تن، ماهی ساردین و جلبک دریایی به دلیل غنی بودن از مقادیر بالای ید می تواند مفید باشد.



- از یک رژیم پر فیبر تشکیل شده از سبزیجات و میوه جات فراوان برای جلوگیری از یبوست استفاده کنید. (سبزیجات را بصورت پخته مصرف نمایید)
- سویا می تواند مانع جذب کافی داروهای تیروئید شود. بنابراین باید در مصرف آن احتیاط گردد.

- تامین مقادیر کافی ویتامین های ث، آ، ای و ویتامین های گروه ب به ویژه ب2، ب3، ب6 که برای تولید هورمون تیروئید ضروری هستند.

دارو

- داروی حاوی هورمون تیروئید تجویز خواهد شد.
- میزان مصرفی برحسب سن، وزن، جنس، ظرفیت عملکرد تیروئید و سایر داروهای مصرفی تعیین می شود.

در چه شرایطی به پزشک مراجعه نمایید؟

- اگر علائم در عرض 3 هفته از شروع درمان رو به بهبود نگذارند.
- اگر دچار علائم جدید و غیر قابل توجیه شده اید. داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.
- اگر اغما یا تشنج رخ دهد، فوراً باید از اورژانس درخواست کمک شود.