

کیست مجرای گارتنر

			شماره پرونده:
نام خانوادگی:	نام:	بخش:	پزشک معالج:
		اتاق:	
		تخت:	
نام پدر:	تاریخ تولد:	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:
	جنس: ☐ زن ☐ مرد		
بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:			
مراقبت در منزل : - دریافت غذاهای غنی از فیبر نظیر سبزیجات، میوه‌ها را جهت جلوگیری از یبوست افزایش دهید. - در حد ظرفیت بدن خود فعالیت و بین فعالیت‌ها استراحت کافی داشته باشید. - با توصیه پزشک تا بهبودی کامل از فعالیت‌های سنگین اجتناب کنید. - از عوارض این عمل خونریزی و عفونت است که به علائم آن توجه کنید و در صورت لزوم به پزشک مراجعه نمایید. - بهتر است حداقل برای دو هفته (ترجیحاً تا پایان درمان) از نزدیکی خودداری کنید. - رعایت بهداشت ناحیه تناسلی امری ضروری است. - از پوشیدن لباس‌های تنگ و پلاستیکی پرهیز نمایید. - جهت تسکین درد از دارو مسکن تجویز شده طبق دستور پزشک استفاده نمایید. - داروهای تجویز شده توسط پزشک (مانند آنتی بیوتیک) را در ساعات معین طبق دستور پزشک و تا اتمام کامل دوره مصرف نمایید. - از استعمال هر گونه دارو به غیر از داروی پزشک معالج حتی به صورت بخور یا دود پرهیز نمایید. در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید - در زمانی که توسط پزشک معالج مشخص شده، به وی مراجعه کنید. - در صورت داشتن تب، خونریزی، ترشح ناحیه عمل، خروج کاتتر، التهاب و قرمزی ناحیه عمل به پزشک مراجعه کنید. - در صورت بروز هر گونه علائم نگران کننده دیگر			