

کیست های واژینال

			شماره پرونده:
نام خانوادگی:	نام:	بخش:	پزشک معالج:
		اتاق:	
		تخت:	
نام پدر:	تاریخ تولد:	تشخیص (علت بستری):	تاریخ پذیرش:
	جنس: ☐ زن ☐ مرد		
بیمار محترم ضمن آرزوی سلامتی برای شما شایسته است که پس از ترخیص از بیمارستان موارد زیر را به دقت مطالعه و اقدام نمایید:			
مراقبت در منزل:			
- مایعات فراوان، میوه های حاوی ویتامین ث و رژیم غذایی سرشار از میوه و سبزیجات جهت جلوگیری از یبوست و کاهش فشار به ناحیه مبتلا داشته باشید. - فقط تا زمانی که پزشک تعیین کرده از مقاربت خودداری کنید. - از انجام فعالیت های سنگین خودداری کنید. - ممکن است لازم باشد ۳ تا ۴ روز بعد از عمل با تجویز پزشک از لگنچه کوچکی حاوی آب گرم بتادین یا آنتی بیوتیک، استفاده کنید. - ممکن است لازم باشد روزانه ۳-۴ بار هر بار به مدت ۲۰-۱۰ دقیقه، فقط ناحیه پرینه و باسن خود را در لگنچه کوچکی حاوی آب گرم قرار دهید این کار باعث کاهش خونریزی، اسپاسم و عفونت می شود (اضافه کردن بتادین به آب یا محلول آنتی بیوتیک با نظر پزشک معالج می باشد). - رعایت بهداشت ناحیه تناسلی امری ضروری است. - خارج کردن کاتتر چهار تا شش هفته بعد از درمان صورت می گیرد. در صورتی که قبل از مدت زمان تعیین شده کاتتر بیافتد، بایستی مجدداً گذاشته شود. - از پوشیدن لباس های تنگ و پلاستیکی پرهیز نمایید.			
در صورت مشاهده موارد زیر به بیمارستان و یا پزشک مراجعه کنید			
- داشتن درد در ناحیه تناسلی و ادراری - تب بالا - افزایش ترشحات چرکی - عدم بهبودی - در صورت بروز هر گونه علائم نگران کننده دیگر.			