


گرافت چیست؟

برداشتن قسمتی از پوست سالم و پیوند این پوست به ناحیه آسیب دیده را گرافت می گویند. قسمتی از بدن که پوست آن برداشته می شود، دنور می گویند. این قسمت عموماً ناحیه ران ها یا شکم یا پهلوها را شامل می شود.

پوست برش خورده را می توان به صورت شیت گرافت (پوست دست نخورده) یا به صورت مش گرافت استفاده کرد. در حالت مش گرافت یک قسمت از پوست، برای ناحیه وسیع تری قابل استفاده است. گرافت ها می توانند به صورت اوتوگرافت (از خود بیمار) یا آلوگرافت (از یک فرد دیگر) یا آلو پالستیک (ساخته دست بشر) باشند.

فلپ چیست؟

فلپ، مجموعه ای از بافت هاست (پوست، عضله، استخوان و عروق) که برای پوشاندن زخم و جبران بافت از دست رفته بکار می رود (یا از اطراف بافت آسیب دیده یا از بافتی در جای دیگر بدن استفاده می شود).



فلپ و گرافت هر دو بافتی هستند که به عنوان پیوند استفاده می شوند. در جراحی فلپ پیوند بافت به همراه عروق تغذیه کننده آن ناحیه انجام می شود، در صورتی که در جراحی گرافت منابع خونی به همراه ناحیه پیوند زده شده، نیست.

نشانه های عفونت پس از جراحی:

ترشحات زرد یا سبز رنگ، تغییر بوی ترشحات محل جراحی، قرمزی یا سفت شدن اطراف، برش جراحی، گرم بودن محل برش جراحی موقع دست زدن به آن، تب، افزایش درد، افزایش خونریزی و ترشحات زیاد که پانسمان را خیس کند. در صورت مشاهده عالم عفونت تا سه ماه بعد از جراحی، به بیمارستان مراجعه نمایید. ممکن است به صورت طبیعی بعد از جراحی، کمی احساس

سوزش، خارش، درد و بی حسی در محل برش جراحی داشته باشید. همچنین ممکن است کمی ترشح، کبودی و برآمدگی کوچکی در این قسمت مشاهده کنید. البته باید گفت این علائم طبیعی هستند و جای نگرانی ندارد. به محل زخم جراحی، الکل، آب اکسیژنه و بتادین نزنید، زیرا باعث آسیب بافت و تاخیر در بهبودی زخم می شود. صرفاً از بتادین جهت تمیز نمودن اطراف زخم استفاده کنید و به هیچ عنوان از بتادین برای روی زخم استفاده نکنید.

حرکت عضو جراحی شده:

از هرگونه حرکات ناگهانی، فشار و خوابیدن به روی ناحیه فلپ شده جداً خودداری نمایید. خوابیدن بر روی محل عمل و فشار ایجاد شده بر این ناحیه موجب رد پیوند و عمل جراحی ناموفق خواهد شد. حرکت اندام تحت عمل جراحی، حتماً باید با اجازه پزشک معالج انجام شود و تا زمانی که به شما اجازه داده نشده؛ از حرکت عضو جراحی شده، اجتناب نمایید.

اقدامات لازم پس از عمل جراحی:

✓ پزشک جراح برای بستن محل برش جراحی از بخیه جذبی و یا غیر جذبی استفاده می کند. هفته اول بعد از جراحی روی پانسمان آب



مرکز آموزشی درمانی امین

گرافت و فلپ

شناسنامه پمفلت آموزشی	
موضوع	عمل جراحی گرافت و فلپ
تهیه کننده	واحد آموزش سلامت
تأیید کنندگان علمی	دکتر اسحاقیان
سمت	فوق تخصص فک و صورت
تاریخ تهیه	1403
تاریخ بازنگری	1406
نوبت پمفلت	بازنگری-کد 0 ENT-05

منبع: برونوسودارث

جهت استفاده از مطالب آموزشی به سایت بیمارستان

مراجعه نمایید. www.amin.mui.ac.ir

نزید. ده روز بعد از عمل جراحی، می توان بدون پانسمان استحمام کرد و در صورت نیاز به استحمام در هفته اول، از پانسمان ضد آب استفاده کنید.

✓ پانسمان محل جراحی یک روز در میان در منزل تعویض شود.

✓ ناحیه گرافت و فلپ در معرض مستقیم نور خورشید قرار نگیرد. از هر گونه ضربه و خارش در ناحیه گرافت و فلپ خودداری کرده و حتماً از لباس های نخی و گشاد جهت پوشش استفاده نمایید و از قرارگرفتن در محل گرم و مرطوب خودداری کنید. از حرکات ناگهانی و فشار به عضو فلپ شده خودداری کنید. روی محل فلپ یا گرفت دراز نکشید و برای پیشگیری از بروز زخم فشاری در نواحی دیگر، هر دو ساعت روی نواحی سالم تغییر وضعیت دهید

✓ هر روز محل جراحی شده را بررسی کنید، تا عفونت نکرده باشد. اگر عاظم عفونت را در آنجا دیدید، به پزشک خود مراجعه کنید. همچنین رنگ و دمای فلپ باید طبیعی و هم رنگ پوست سالم اطراف باشد.