

آمادگی های لازم جهت انجام سی تی اسکن های با کنتراست تزریقی

بررسی آزمایش های Cr و BUN (کراتینین خون) الزامی است.

بیمار باید فرم رضایت نامه و عدم حساسیت دارویی خود را پر نموده و به کارشناس مربوطه تحویل دهد.

بیمار باید ۳ ساعت قبل از انجام آزمون ناشتا باشد. توصیه می شود بیمار ساعت ۶ تا ۶,۳۰ صبح صبحانه سبک میل کند و ساعت ۸ تا ۸,۳۰ جهت انجام اسکن به بخش مراجعه نماید.

در صورت مصرف متفورمین ۴۸ ساعت قبل و ۴۸ ساعت بعد از سی تی اسکن دارو باید قطع شود.

در صورتی که بیمار دیالیزی می باشد برای انجام سی تی اسکن با تزریق (با کنتراست) حتما حتما روز نوبت دهی اعلام کند (انجام سی تی اسکن با کنتراست باید ۲ ساعت قبل از دیالیز انجام شود).

بیماران خانم حتما از عدم بارداری خود مطمئن باشند و در صورت شک به بارداری کارشناس را در جریان قرار دهند .

جهت تشخیص درست بیماری، تمام مدارک قبلی خود را حتما به همراه داشته باشید.